



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Φοράτε κατάλληλα γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό. **“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”** **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** - Αν πέσει στο δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε το δέρμα προσεκτικά με άφθονο νερό και αν είναι δυνατόν και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός και επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. - Αν πέσει στα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε παράγοντες εξουδετέρωσης. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός και επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. - **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακίνηση στον καθαρό αέρα. Αν παρουσιαστεί αναπνευστική δυσκολία, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του ξεπλύνετε το στόμα με νερό και δώστε του να πει άμεσα άφθονο νερό. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Σημείωση για το γιατρό:** Αρχικά μέτρα αντιμετώπισης: εγκατάσταση αεραγωγού, απομάκρυνση εκκρίμάτων και αποκατάσταση αναπνευστικής λειτουργίας. **Αντίδοτο:** αν δεν έχει εμφανιστεί κνάνωση, χορηγήστε θεϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως σε δόσεις 2-4 mg. Αν έχει εμφανιστεί κνάνωση χορηγήστε την ίδια δόση ατροπίνης ενδομυϊκά και παράλληλα εφαρμόστε μέτρα βελτίωσης της παροχής αέρα στους πνεύμονες. Επαναληπτική χορήγηση ατροπίνης κάθε 5-10 λεπτά μέχρις ατροπινισμού. Επανεργοποίηση της χολινεστεράσης: η ουσία Pralidoxime chloride (2- PAM, Protopam chloride) θα επανενεργοποιήσει την χολινεστεράση και μπορεί να είναι αποτελεσματική ως συνοδευτικό της ατροπίνης. Για ενήλικες χορηγήστε μία αρχική δόση 1-2 g 2-PAM κατά προτίμηση ως εκχύλισμα σε 100 ml αλατούχου διαλύματος, για μια περίοδο 15-20 λεπτών. Αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό ή αν έχει εμφανιστεί πνευμονικό οίδημα, η δόση να χορηγηθεί αργά ενδοφλεβίως ως διάλυμα 5% σε νερό για διάστημα τουλάχιστο 5 λεπτών. Μετά από 1 ώρα περίπου και αν η μυϊκή αδυναμία παραμένει, χορηγήστε δεύτερη δόση 1-2 g. Αν η μυϊκή αδυναμία επιμένει, μπορούν να χορηγηθούν προσεκτικά συμπληρωματικές δόσεις. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ενδοφλέβια χορήγηση, προτείνεται η δόση να εφαρμοστεί ενδομυϊκά ή υποδόρια. Αντενδείκνυται η χορήγηση ουσιών όπως η μορφίνη, η επινεφρίνη, η θεοφυλλίνη και τα προεμιακά φάρμακα. Απαιτείται η παρακολούθηση του ασθενή για πιθανή εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος, το οποίο σε σοβαρές περιπτώσεις δηλητηρίασης μπορεί και να παρουσιαστεί ακόμη και μετά από 12 ώρες. Με τα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος, ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί σε συσκευή παροχής οξυγόνου και να του παροσχεθεί συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Επικινδύνου για τις μέλισσες
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας

**ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ & ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ**

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η δραστική ουσία fosthiazate είναι αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης. Αρχικά δρα ως νηματωδοστατικό προκαλώντας παράλυση των νηματωδών και στην συνέχεια σαν νηματωδοκτόνο. Θάνατοι των νηματωδών παρατηρούνται από την τρίτη ημέρα της εφαρμογής και μετά. Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτωσης νηματωδών παρατηρείται από την 9η μέχρι την 17η ημέρα από την εφαρμογή του. Και με τους δύο τρόπους δράσης το προϊόν εμποδίζει την προσβολή των ριζών ή εφόσον έχει ήδη συμβεί η προσβολή, την περαιτέρω ανάπτυξη της

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογή 3-6 μέρες πριν τη μεταφύτευση σε γυμνό έδαφος με την στάγδην άρδευση που γίνεται πριν τη μεταφύτευση της καλλιέργειας και χρησιμοποιώντας τα εγκατεστημένα πριν τη φύτευση συστήματα στάγδην άρδευσης. Στόχος είναι να ενσωματωθεί ομοιόμορφα το προϊόν κάτω και γύρω από τη θέση φύτευσης σε βάθος 10-15 cm. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού καθώς η ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο βάθος επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιήστε την ποσότητα νερού που εφαρμόζεται συνήθως κατά τη στάγδην άρδευση. Η εφαρμογή και ενσωμάτωση του προϊόντος στο έδαφος πρέπει να γίνεται μέσω καλά διατηρημένων και ρυθμισμένων συσκευών άρδευσης. **Τομάτα και μελιτζάνα (θερμοκηπίου):** για την αντιμετώπιση των κομβονηματωδών (*Meloidogyne* spp.): 0.5- 1 λίτρα/στρ. (η μικρότερη δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που σε όλη την έκταση του θερμοκηπίου ο πληθυσμός των νηματωδών είναι χαμηλός).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Το προϊόν αναμειγνύεται με το νερό του συστήματος άρδευσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά με άφθονο καθαρό νερό όλα τα μέρη του συστήματος άρδευσης, ώστε να μην απομείνουν υπολείμματα φαρμάκου. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Απορρίψτε τα νερά ξεπλύματος με ασφαλή τρόπο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Όλες οι δυνατές καλλιεργητικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με φυσικές και βιολογικές μεθόδους ελέγχου παρασίτων, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθυσμοί των Κομβονηματωδών. • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποικιλίες ντομάτας και μελιτζάνας ανθεκτικών / ανεκτικών στους Κομβονηματώδεις. • Θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα αμειψισποράς με καλλιέργειες λιγότερο ευαίσθητες σε Κομβονηματώδεις. Αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού των νηματωδών σκωλήκων. • Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το προτεινόμενο κείμενο της ετικέτας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ:** 3-6 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σε βαριά ή μέτρια εδάφη το NEMATHORIN 150 EC μπορεί να προκαλέσει κάποια παροδική χλώρωση ή νέκρωση της κορυφής στα νέα μεταφυτευμένα φυτά τομάτας ή μελιτζάνας. Τα φυτά επανέρχονται όταν αναπτυχθεί η καλλιέργεια. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την καλλιέργεια, συνιστώνται τα ακόλουθα μέτρα: - Πριν από την εφαρμογή, το έδαφος θα πρέπει να είναι καλά και ομοιόμορφα καλλιεργημένο και ποτισμένο. - Θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συνιστώμενες δόσεις και ο χρόνος εφαρμογής. - Θα πρέπει να ελέγχεται το σύστημα στάγδην άρδευσης προσεκτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή δόση του σκευάσματος και η ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος. - Τα μεταφυτευμένα φυτά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την καλή ανάπτυξη των φυτών, όπως η ορθολογική άρδευση και λίπανση και κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμοκηπίου. - Σε μέτρια ή βαριά εδάφη, πρέπει να εφαρμόζεται το μέγιστο μεσοδιάστημα μεταξύ της εφαρμογής και της μεταφύτευσης (6 ημέρες).

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο. Εφαρμόζεται πριν την μεταφύτευση των καλλιεργειών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής ειδικών ή επικινδυνών αποβλήτων. Προτείνεται τα κενά μέσα συσκευασίας να ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και να εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαρτιάστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προφυλαγμένο από παγετό σε θερμοκρασίες από 0-32οC.

Ημ.Παρασκευής, Αρ.Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας.

