

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκληθεί εμετός. Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στο νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Ειδικές προφυλάξεις για τα Ζιζανιοκτόνα:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτηρά).
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Μην ψεκάζετε στο ίδιο χωράφι πάνω από μία φορά το χρόνο.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm. (45 psi).
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.
- Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.
- Μη σπέρνετε στο ίδιο χωράφι μηδική, σιτηρά, σόργο, καλαμπόκι, μαρούλια και χαχαροτεύτα πριν περάσουν δώδεκα (12) μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
- Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) μήνες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό για τα σιτηρά. Το NEPTUNE 45SC όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη



ΥΨΙΛΟΝ®

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης:
CEREXAGRI SAS

1 rue des frères Lumière, 78373 Plaisir, Cedex, France
Τηλ.: +33 (0)1 30 81 73 00/Fax: +33 (0)1 30 81 72 50
E-mail: lplinto@uniphos.com

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση:

UNITED PHOSPHORUS LIMITED

Chadwick House, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6AE, United Kingdom

Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ®

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Πλυνού 32, Βούλαρα, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 210 311377, Fax: 210 334378
E-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Νέπτουν
NEPTUNE
45SC

Ζιζανιοκτόνο

Συμπυκνωμένο Ενωτήριο (SC)

Napropamide - Ναπροπαμάντ 45%

Εγγυημένη σύνθεση: Napropamide : 45 % β/ο
Βοηθ. ουσίες : 55,85% β/β

Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

Απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλώς.

Αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών γενικότερα.

•Ερεθίζει τα μάτια.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 7490 /21-06-1996.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Για Ετήσια και Πολυετή Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια (1) (2) στις καλλιέργειες :

ΦΡΑΥΔΑ: (4) 600-900 κ.εκ./στρ. (3): Εφαρμόζεται σε μεταφυτευόμενη και ήδη εγκατεστημένη φράουλα : α) την άνοιξη, ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν δεν βρέξει μέσα σε 1 εβδομάδα πρέπει να γίνει ενσωμάτωση με τεχνητή βροχή ή να ενσωματωθεί σε βάθος 2,5-5 εκ., β) τέλη άνοιξης έως και το καλοκαίρι ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες πρέπει να ενσωματωθεί με τεχνητή βροχή.

ΚΑΠΝΟΣ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ : 225-400 κ.εκ./στρ.: Εφαρμόζεται : α) Προφυτωτικά: ενσωμάτωση σε βάθος 2,5-5 εκ. μέσα σε 2 ημέρες από την εφαρμογή, β) Προφυτωτικά: επιφανειακός ψεκασμός αμέσως μετά την σπορά ακολουθούμενος με τεχνητή βροχή 1-2,5 χιλιοστά (αν δεν βρέξει μέσα σε 2 ημέρες).

ΣΠΟΡΕΙΑ (Καπνού, Πιπεριάς, Ντομάτας): 500-800 κ.εκ./στρ. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σπορείου μετά την σπορά και πάντοτε πάνω στο στρώμα κοπριάς ή άμμου που προστίθεται πάνω από τον σπόρο. Μπορεί να γίνει ψεκασμός με χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης και να ενσωματωθεί με πιστιπήρι.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά), ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια, Οινοποιήσιμα): 800-900 κ.εκ./στρ. : Εφαρμόζεται : α) Προφυτωτικά : ενσωμάτωση σε βάθος 5 εκ. μέσα σε 5 ημέρες από την εφαρμογή (οι γυμνές ρίζες να μην έρχονται σε επαφή με το ψεκασμένο έδαφος), β) Επιφανειακή εφαρμογή μετά το φύτεμα ή σε εγκατεστημένα φυτά. Συνιστάται ψεκασμός σε γυμνές επιφάνειες (εάν υπάρχουν πολλά ζιζάνια χρησιμοποιείται μίγμα με ένα ζιζανιοκτόνο επαφής). Πρέπει να χρησιμοποιείται αρκετό νερό για τα υπάρχοντα ζιζάνια και να φθάνει στην εδαφική επιφάνεια. Αν δεν βρέξει μέσα σε 7 ημέρες ποτίζεται με τεχνητή βροχή 1-2,5 χιλιοστά.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50 για όλες τις καλλιέργειες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδος: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

(1) Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοπανσές (Viola arvensis), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Δωδεκάνθι (Laminum amplexicaule), Σινάπια (Sinapis arvensis), Κίρσιο (Cirsium arvense), Στύφιο (Solanum nigrum)

(2) Αν εφαρμοσθεί νωρίς την άνοιξη καταπολεμά τα ριζώματα της αγριάδας, του βέλαιου και της κύπτερης.

(3) Οι μικρές δόσεις είναι για ελαφρά εδάφη και οι μεγάλες δόσεις για βαριά εδάφη.

(4) Να μην ψεκάζετε στην φράουλα από την άνοιξη μέχρι τη συγκομιδή.

(5) Να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%, όπως επίσης και σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους και, αν δεν βρέξει σε λίγες ημέρες, πρέπει να γίνεται τεχνητή βροχή ή ενσωμάτωση σε βάθος 2,5-5 εκατ. Χρησιμοποιούμε 30-50 λίτρα νερού στο στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί με συνεχή ανάδευση, με πίεση που να μην ξεπερνά τις 3 ATM (45PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Αραιώνετε τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδiluση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιεχόμενο **1** λίτρο