

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην κανίζετε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκέυασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλυθείτε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το **Nicogan® 4 OD**, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνον αραβόσιτος. • Για οπορά χειμερινού ασιτοριού, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του **Nicogan® 4OD** και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. • Εισαγωγός του εργάτη στην καλλιέργεια, αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας



04/2013-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Nicogan®

4 OD

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 4%
Εθαιώδες εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Nicosulfuron 4% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 95,5% β/β
Α.Α.Δ.Α.: 70028/08.02.2013

**Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο κατά αγρωστωδών και
πλητύφυλλων ζιζανίων σε αραβόσιτο**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊνάνδρι
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΝΙΚΟΓΚΑΝ:

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και ηλιτύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβόσιτου. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξείνουβικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκάσμος φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μικρής τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα μετά τον ψεκάσμό, για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά 200 λίτρα). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωρίνη οικιακής χρήσης. Να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού: α) Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικός αυτός). Αδειάστε τελείως το βυτίο. β) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, στο οποίο προσθέτετε μισό λίτρο αμμωνιακής οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσα όλο το σύστημα για 10 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως το βυτίο ξανά. γ) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικός αυτός). Αδειάστε τελείως το βυτίο.

ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: *Αγρωστώδη ζιζάνια:* Μουκρίτσες. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** για εφαρμογή στα 1-3 φύλλα. Δόση: **100-150 κ.εκ./στρ.** για εφαρμογή στα 1-2 αδέλφια. Στάριες. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή στα 2-4 φύλλα. Βέβηλρας από σπόρο και από ρίζωμα. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** για εφαρμογή μέχρι τα 8 φύλλα. Δόση: **125-150 κ.εκ./στρ.** για εφαρμογή στα 10-20 εκ. ύψος. *Πλητύφυλλα ζιζάνια:* Βήλητα. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή στα 2-4 φύλλα. Τάτουλας. Δόση: **100-150 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή στα 2-4 φύλλα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα νερό ανά στρ.

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μία (1). Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

- 1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβόσιτου.
- 2) Να μην πραγματοποιείται ψεκάσμος εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

• Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό στρες υγρασίας και σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. • Κατά την 1η-2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλλωπιστικού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσεως, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. • Να μη χρησιμοποιείται στο "γλυκό καλαμπόκι" καθώς και σε καλλιέργειες οποιασδήποτε παραγωγής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με τα σκευάσματα **Bromoterb® SC** (200 γρ./λίτρο bromoxynil + 300 γρ./λίτρο terbutylazine), **Sulcogan® SC** (sulcatrione 300 γρ./λίτρο), **Bromotril® EC** (bromoxynil) και **Sulcotrek® SC** (sulcatrione 173 γρ./λίτρο + terbutylazine 327 γρ./λίτρο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Μέλος του

