L165051 GREC/5Q

Ninja®
2,5 WG

syngenta®

Φάσμα δράσης:

Μηλιά, Αχλαδιά: *Για Φυλλορύκτες (Phyllonorycter sp) 40 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 100-150 λίτ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Αχλαδιά:*** *Για την Ψύλλα (Psylla pyri) 40 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 100-150 λίτ./στρ.. Ψεκασμοί κατά την Άνοιξη όταν ο πληθυσμός είναι χαμηλός και το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν. Έως 2 εφαρμογές.* ***Ροδακινιά, Νεκταρινιά:*** *Για τον Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) 40 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40-60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 100-150 λίτ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Αμπέλι:*** *Για την Ευδεμίδα (Lobesia botrana) και την Κοχυλίδα (Europoecilia ambiquella) 40 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 100 λίτ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Ελιά:*** *•Για τον Πυρηνοτρήτη (Prays oleae) 20 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού* ***(ανθόβια γενιά)*** *και 40 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού* ***(καρπόβια γενιά)****, ή 40-80 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 200 λίτ./στρ.. Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών. 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών. •Για τον Δάκο (Bacteroceras oleae) 500 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 300 κ.ε. ψεκ. υγρ. ανά δένδρο / 10 δέντρα/στρέμμα. Δολωματικοί ψεκασμοί από εδάφους σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό. Έως 2 εφαρμογές ανάλογα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες.* ***Πατάτα:*** *Για τον Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata) 40 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ & Θ):*** *Για τις Αφίδες (Myzus persicae), για τον Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata), για το Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) και για την Σποντόπτερα (Spodoptera spp) 50 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 γρ. σκευάσμ./στρέμμα* ***(Υ)*** *και 25-75 γρ. σκευάσμ./στρέμμα* ***(Θ)****. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ.* ***(Υ)*** *και 50-150 λίτ./στρ.* ***(Θ)****. Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Αγγούρι, Κολοκύθι (Υ & Θ):*** *Για τις Αφίδες (Myzus persicae), για το Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) και για την Σποντόπτερα (Spodoptera spp) 50 γρ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 γρ. σκευάσμ./στρέμμα* ***(Υ)*** *και 25-75 γρ. σκευάσμ./στρέμμα* ***(Θ)****. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ.* ***(Υ)*** *και 50-150 λίτ./στρ.* ***(Θ)****. Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών.* ***Βαμβάκι:*** *•Για το Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) 80-100 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ. Ψεκασμός άμεσα με την έναρξη εκκόλαψης των ωών της β' και γ' γενιάς. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών*. •Για τον Θρίπα (Thrips tabaci) 80-100 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ.. Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών*. •Για τις Αφίδες (Aphis gossypii Myzus sp.) 80 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ.. Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών*. •Για το Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella) 80 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη των πτήσεων της 2ης γενιάς και επανάληψη ανά δεκαπενθήμερο. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών*.* ***Λάχανο:*** *Για την Πιερίδα (Pieris brassicae) και για την Μαμέστρα (Mamestra brassicae) 30-50 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ. Όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών.*

**Ο μέγιστος αριθμός των εφαρμογών στο βαμβάκι είναι συνολικά 2 για όλους τους εχθρούς.*

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg ℮

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Μην αναπνέετε την σκόνη. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. •Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

•Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- ***Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:*** *Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό.*
- ***Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:*** *Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας και ξεπλυθείτε καλά, με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι νερό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν.*
- ***Σε περίπτωση εισπνοής:*** *Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό.*
- ***Σε περίπτωση κατάποσης:*** *Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Μη προκαλέσετε εμετό.*

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας ***30 μέτρων*** *από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες,* ***20 μέτρων*** *για τα λαχανικά και* ***10 μέτρων*** *για τις λοιπές καλλιέργειες.*

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας ***10 μέτρων*** *από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και* ***5 μέτρων*** *για τις λοιπές καλλιέργειες.*

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμ. παρτίδας:
Ημ. παραγωγής:

L165051 GREC/5Q

Ninja®
2,5 WG

syngenta®

L-cyhalothrin (Λ-συαλοθρίν)
(Ομάδα δρώντος πυρεθρινοειδή)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
L-cyhalothrin 2,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες 97,22% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
14330/8-7-2009

Ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Syngenta Hellas A.E.B.E.
Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- ***Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και όταν εισπνέεται.***
- ***Ερεθίζει το δέρμα.***
- ***Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.***
- ***Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.***

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- ***Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.***

TM

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg ℮

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμός φυλλώματος.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Η απόσυρση ή η καταστροφή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή (Θερμοκρασία > 1200° C για τουλάχιστον 2 λεπτά). Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος δράσης:
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

- *Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.*
- *Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.*
- *Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.*
- *Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με NINJA 2,5 WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.*
- *Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.*

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Σταφύλια, Ελιές, Πατάτες, Λάχανο: *7 ημέρες.*
Τομάτες, Μελιτζάνες, Αγγούρια,
Κολοκύθι: *3 ημέρες.*
Βαμβάκι: *14 ημέρες.*