

Σ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

TOE

TOE

TOE

Ημ. παρασκευής, Αρ. παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕΣ)

Αρ. έγκρ. Κυκλ.:

14389/24-04-2012

14389/24-04-2012

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Εύφλεκτο
Επιβλαβές όταν εισπνέεται και
σε περίπτωση κατάποσης
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
σε επαφή με το δέρμα
Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή
σκάσιμο

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ**

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Κάτοχος της έγκρισης:
CHEMINOVA AGRO FRANCE S.A.,
21 Avenue Eugene Gazeau,
Senlis 60300 Γαλλία .

 **ΚΕΛΛΑΦΑΡΜ** ΑΕ

ΑΘΗΝΑ: Φλέμγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
info@hellafarm.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ
(Πορτογαλικά, Λατινικά, Μαγαντρινά, Γκριπ-φουρτί: για *Αφίδες (Aphis spiraecola* syn. *Aphis citricola*) με δόση 100-120 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 120-140 κ.κ./στρέμμα. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.) 120. 1ος φεκασιμός στο τέλος της ανθήσεως και ο 2ος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού (καρπός με έντονο πράσινο χρώμα). **ΕΛΙΑ:** για *Δάκο* α. *Αφίδες* (αφιδότομο) με δόση 625 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 12,5 κ.κ./στρέμμα (200 ml φεκασιτικού υγρού ανά δένδρο/σε 10 δένδρα/στρέμμα). Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 2. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 1. Μπορεί να συνδυαστεί με ένα φεκασιό καλύψης μεσοστάθιας τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Δολωματικό φεκασιό μικρό ούγκου (LW) από το έδαφος σε συνδυασμό με ενεκκρίμενο εντομοκτόμο. Ποσότητα δολωμάτων 2 στρέμ./στρέμμα. Άρχισμα συνήθως 10-15 τονών-αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων. **ΕΛΙΑ:** για *Δάκο* α. *Αφίδες* (αφιδότομο) με δόση 625 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 12,5 κ.κ./στρέμμα. **ΕΛΙΑΚΟΚΑΡΠΟΙ:** β) Με. κάλυψη με δόση 80-100 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 96-120 κ.κ./στρέμμα. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 120. Μεκισμολό καλύψης: Άρχισμα με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται ανά διαστήματα ενεργός προσβολής (μεσοστάθιας) επεμβαδών 14 ημέρες. **ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΟΝΑ:** (εσολαί): για *Θρίπες (Thrips tabaci)* με δόση 167-200 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 30. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ:** (υπαίθριοι): *Αφίδες (Aphis gossypii)*, *Aphis sp.*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) με δόση 167-200 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50-60 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 30. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 14 ημέρες. **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΔΟΝΟΥΡΑ:** *Αφίδες (Aphis gossypii)* με δόση 167-200 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50-60 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 30. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την ανθήση και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. **ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΙ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ:** Μύγα του καρπού (*Psila rosae*) με δόση 167-200 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50-60 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 30. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 3. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. **ΖΑΧΑΡΟΤΥΤΗΛΑ, ΠΑΝΤΙΖΑΡΙΑ, ΓΟΥΓΓΥΛΑ:** *Αφίδες (Aphis fabae)* με δόση 250-300 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50-60 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 20. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 21 ημέρες. **ΣΙΤΑΡΑ:** (ατάρι, σικάλη, τριτικάλε, σκληρό ατάρι): *Αφίδες (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum)* με δόση 250 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 20. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 1. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΑΛΟΠΙΣΤΙΚΑ** (υπαίθριοι και θερμοκηπίοι): *Αφίδες (Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis heliadae, Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Macrosiphonella sanborni)* με δόση 50-60 κ.κ./100 λίτρα φε. υγρού ή 50-60 κ.κ./στρέμμα. Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρα/στρέμ.): 100. Με. αριθ. εφάρ. ανά κ.κ. περίοδο: 2. Ψεκασιμός με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 14 ημέρες. **ΠΑΡΕΠΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιεργήσεις εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 2. Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες. 3. Με την εφαρμογή το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. 4. Μην εφαρμόζετε ποτέ πριν την πλήρη άνθιση των αφίδων μπορούν να παράγουν μελιτταίο. 5. Μην εφαρμόζετε ποτέ πριν την εμφάνιση των αφίδων. 6. Μην εφαρμόζετε ποτέ πριν την εμφάνιση των ενοχλητικών βρογχοσπασμών. 7. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτώσης των μελάνων, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μελιτταίοι πρέπει να περάσουν στις κυψέλες τους ή να μπόρα εξοφιστούν από τους φυτόντας ή να περάσουν στις κυψέλες ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Τρόπος εφαρμογής: α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος της μέρη απορρόφησης β) Δολωματικό φακελάκι μπορεί ή/και από εδαφούς

Τρόπος παροχής φυλλατοκτόνου υγρού: α) για τους φυλλατοκτόνους φυλλώματος: γεμίζουμε το δοχείο με φυλλατοκτόνο μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αφαιρούμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα που να καλύπτει το σκεύασμα το φυλλατοκτόνο δοχείο ανδρώντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανδρόση. β) για τους δολωματικούς φυλλατοκτόνους: πλένουμε τον ανδρόση προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του φυλλατοκτόνου, αφού προηγουμένως έχουμε διαλύσει τους λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανδρόση πρέπει να είναι συνεχής και **καθαρή**. **Καθαρό** σημαίνει: Αφαιρούμε την εφαρμογή οδεύει ταλείς του φυλλατοκτόνου. Ξεπλύνουμε ολογιστικά το βύθιο και τα μέρη του φυλλατοκτόνου με κοινό απορρυπαντικό φακελάκι και τα οράτα υπόλειμμα και ξεπλύνουμε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το φυλλατοκτόνο μηχανήμα. Μην καθαρίζετε το φυλλατοκτόνο εξοπλισμό και υφάρκινετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδρόγειους πόρους.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοπαίες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: (1) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές μέθοδοι προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός των εντόμων εξελισσόμενου ο αριθμός των επεμβάσεων στον ελάχιστο απαιτούμενο για αποτελεσματικό έλεγχο. (2) Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και χρόνος εφαρμογής και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος (3) Να φερόμεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο με βάση τα κατάλληλα επιπλοκινητότητας (έδν υψόμετο) και με τρόπο που να μην προκαλείται ο κίνδυνος για τους υελάτους οργανισμούς (4) Να κινείται επιμελώς και να εναλλάσσεται τον πληθυσμό. Να αποφευχθεί η συσσώρευση ή χρήση σκευασμάτων με παρόμοια περιεχόμενα διπλάσια ή να εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόμα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδες με διαφορετική ανθεκτικότητα (5) να περιεβαίνει και τα παραδοσιακά σκευάσματα έχουν δείξει διαφορετική ανθεκτικότητα με τα οργανωσμοκτόμα όπως τα οργανωσμοκτόμα.