



OCTAVE® 46 WP

Prochloraz (προκλοράζ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση : Prochloraz 46.1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 48.45% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική
και θεραπευτική δράση.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο
για επαγγελματίες χρήστες.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 6558/15-7-92

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 ΓΡΑΜ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Wädenswil Branch, Ελβετία.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,

Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα.

Υπόμνημα προς τον ιατρό:

Συμπτώματα: Γαστρεντερικές παθήσεις.

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο.

Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από σπόρο μανιταριού, στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε χώρο δροσερό (θερμοκρασία 20°C) και προστατευμένο από παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.



OCTAVE® 46 WP

Prochloraz (προκλοράζ)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση : Prochloraz 46.1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 48.45% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική
και θεραπευτική δράση.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο
για επαγγελματίες χρήστες.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 6558/15-7-92

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 ΓΡΑΜ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Wädenswil Branch, Ελβετία.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,

Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Ψεκάσμοι φυλλώματος

Β. Για τα μανιτάρια, ψεκάσμός του υποστρώματος με 1-2 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά τετρ. μέτρο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Φαιά σήψη (*Monilia spp.*).

Συνιστώνται 3 ψεκάσμοι στα στάδια: α) 1-2% της άνθησης, β) στην πλήρη άνθηση, γ) στην πτώση των πετάλων. Στις περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων συστήνεται να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες τους. Δόση: 60 γρ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 160 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Ξηρή σήψη (*Verticillium fungicola*), Υγρή σήψη (*Mycogone perniciosa*), Αραχνοειδής ιστός (*Hyphomyces rosellus*). Εφαρμόστε το σκεύασμα 5-7 ημέρες μετά την επικάλυψη. Δόση: 3 γρ./τετρ. μέτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 1-2 λίτρα/τετρ. μέτρο. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*), Μελανή κηλίδωση των φύλλων (*Diplocarpon rosae*), Τεφρά σήψη (*Botrytis cinerea*). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επαναλάβετε, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, ανά 10-14 ημέρες. Η μικρή δόση αφορά προληπτικές και η μεγάλη θεραπευτικές εφαρμογές. Δόση: 50-100 γρ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού το περάσουμε από ψιλή σitta αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό ανά λεπτό).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πυρήνoκαρπα - αμυγδαλιά: Πτώση των πετάλων.

Καλλιεργούμενα μανιτάρια: 8 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργειες και δόσεις και με τους συνιστώμενους τρόπους εφαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σε ορισμένα είδη μανιταριών μπορεί να παρατηρηθούν κάποιοι κακοσηματισμοί ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χωρίς όμως αυτό να επιδρά στις τελικές αποδόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: ---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



0912

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημ/νία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ (λίτρα νερού)

Δόση: 60 γρ. σε 100 **λίτρα νερού**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

Δόση: 60 γρ. σε 100 λίτρα **ψεκαστικού υγρού**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.