

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ●Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ● Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα● Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, προστατευτική μάσκα, γυαλιά και καπέλο ● Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. ● Να μην χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών ●Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ● Μην εισέρχεστε σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Αν πέσει στα μάτια ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν πέσει στο δέρμα πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν παρατηρηθούν αναπνευστικές δυσκολίες ζητήστε τη βοήθεια γιατρού. Αν καταποθεί χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό και μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του αμέσως. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλισή της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό καλά αεριζόμενο και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αριθμ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ημ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης



ΟΗΛΑΥΟ 50SC

Fluazinam (Φλουαζινάμ) 50%

Εγγυημένη σύνθεση: Fluazinam 50% β/ο
Βοηθ. ουσίες 59,62% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:
6736/20.11.03

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώτριο ψεκαστήρα διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Παρασκευαστής-
Κάτοχος της έγκρισης -
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
ISK Biosciences Europe S.A., Βέλγιο

Υπευθύνος επικοινωνίας-
Συσκευαστής:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμεγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
info@hellafarm.gr

**Περιεχόμενο:
900κ.εκ.**

ΑΜΠΕΛΙ: Βοτρυτής. Δόση 100-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Ειδικά για τις **οινοποιήσιμες ποικιλίες** προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Παθογόνου α) στην άνθηση β) πριν το κλείσιμο της σταφυλής γ) στο γυάλισμα και δ) στην ωρίμανση. Μέγιστος αριθμός ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.

Ειδικά για τις **επιτραπέζιες ποικιλίες** μία προληπτική εφαρμογή στην άνθηση. Μέγιστος αριθμός ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος. Δόση 30-40 κ.εκ./στρ. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα. Μέγιστος αριθμός ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η δόση είναι ανάλογη της έντασης προσβολής.

ΟΚΘΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (για όλες τις καλλιεργείες): 100 λίτρα/ στρέμμα

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψως

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείτε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στα σταφύλια να μη συνδυάζεται με λάδια, dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Οινοποιήσιμα σταφύλια: 21 ημέρες, Επιτραπέζια σταφύλια: δεν απαιτείται καθώς η τελευταία εφαρμογή γίνεται στην άνθηση, Πατάτα: 7 ημέρες

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.