

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διατηρείτε την αρχική σκευασία ερμητικά κλεισμένη.
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αναμεινέτε το ψεκαστικό νέφος.
- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- Φοράτε κατάλληλη γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπνέει σε ζεστό αέρα. Ενημερώστε τον γιατρό προληπτικά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβανοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να εξαλειωθούν από την έκθεση του δέρματος. Τα βρωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με καθαρό νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 5 λεπτά. Ζητήστε την συμβουλή γιατρού. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τη συνείδησή του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή – Αντιδοτό: Συμπληρωματική και υποστηρικτική αγωγή όπως ενδείκνυται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
ΑΓΓΟΥΡΙ Υπαίθριο & θερμοκήπιου	όδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)	64 (Υ) 120 (Θ)	60-80
	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	80 (Υ) 150 (Θ)	80-100
ΠΕΠΟΝΙ Υπαίθριο & θερμοκήπιου	όδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)	80	60-80
	Περωνόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	100	80-100
ΤΟΜΑΤΑ Υπαίθρια & θερμοκήπιου	όδιο (Leveillula taurica, Oidium sp.)	80 (Υ) 120 (Θ)	80
	Περωνόσπορος (Phytophthora infestans) Αιτερνάρια (Alternaria dauci sp. Solani)	100 (Υ) 150 (Θ)	80-100
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Υπαίθριο & θερμοκήπιου	όδιο (Sphaerotheca fuliginea)	60-80	75-160
			50-80
ΚΑΡΠΟΥΖΙ Υπαίθρου & θερμοκήπιου	όδιο (Erysiphe cichoracearum)	80	80
			100
ΠΙΠΕΡΙΑ Υπαίθρου & θερμοκήπιου	όδιο (Leveillula taurica, Oidium sp.)	80	80
			50-100
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	όδιο (Leveillula taurica)	80	80
ΚΑΡΟΤΟ	όδιο (Erysiphe sp.) Αιτερνάρια (Alternaria dauci)	80-100	266,67-333,33
ΚΡΕΜΜΥΔΙ	Περωνόσπορος (Peronospora destructor)	80	160-200
ΕΣΚΟΡΔΑ	Ίσχυρία (Puccinia allii)	80	160-200
ΦΡΑΟΥΛΑ	όδιο (Sphaerotheca humuli)	80	100-160
ΕΠΑΡΑΓΓΙ	Ίσχυρία (Puccinia asparagi) Στεμφύλιο (Stemphylium sp.)	80	80-160
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΑ	Κερκόσπορα (Cercospora beticola) όδιο (Erysiphe communis)	40-80	100-200
ΡΥΖΙ	Pyricularia oryzae	100	-
ΣΙΤΑΡΙ	Septoria tritici, Puccinia recondita	60-100	-
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum	80-100	-
ΦΑΣΟΛΙ	Uromyces sp	80-100	-
ΜΠΙΖΕΛΙ	Uromyces sp, Ascochyta pisi	80-100	-
ΜΠΡΟΚΟΛΟ	Peronospora parasitica	80-100	-
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	Peronospora parasitica	80-100	-

Όλες οι εφαρμογές γίνονται με ψεκασμούς φυλλώματος, προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Για το ρυζι η εφαρμογή να πραγματοποιείται με ψεκασμό φυλλώματος από το στάδιο του φουσκώματος του κολλέου- μέχρι το τέλος του ξεσταχυώματος.

L171229 GREC/3R



Ortiva®

25 SC

syngenta®



Αζoxystrobin (αζοξυστρομπιν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 6857/10-04-02

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,2% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση για το ωίδιο, τον περονόσπορο, την αιτερνάρια, την σκωρίαση, τον στεμφύλιο και την κερκόσπορα.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Αθηνά, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 ltr

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τα σκευασμάτα του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Το ORTIVA 25 SC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση για το ωίδιο, τον περονόσπορο, την αιτερνάρια, την σκωρίαση, τον στεμφύλιο και την κερκόσπορα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείτε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστάμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Τα κενά σκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ριχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δόση εφαρμογής: Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύμματος είναι ακόμα χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύμματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).

Προστασία ψεκαστικού υγρού/στρώματος: Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλώσης από το ψεκαστικό υγρό.

Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόζετε το Ortiva προληπτικά, πριν ή αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Για βέλτιστα αποτελέσματα προτείνεται η εφαρμογή να γίνεται πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της προσβολής. Μα μην αναμεινεται με προσκολλητικά καθώς και με σκευάσματα με ισχυρή προσκολλητική ή διαλυτική δράση. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με Υγρά Γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα (EC).

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

- Μείνιτος: αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιεργείες.
- Αποφύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές με Ortiva 25 SC.
- Να γίνεται μία εφαρμογή Ortiva 25 SC κάθε 3 επεμβάσεις.

Μετά τον ψεκασμό με Ortiva 25 SC να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα, εναλλαγή του Ortiva 25 SC με τα μυκητοκτόνα που έχουν σαν δραστική ουσία τα kresoxim methyl, famoxadone, fenamidone, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, fluoxastrobin, metominostrobin, orysastrobin, dimoxystrobin & το enestrobin, δεν επηρεάζεται. Οι εναλλαγές συνεχίζονται με την ίδια σειρά και στις ακολουθούσες καλλιεργείες.

Φυτοτοξικότητα:

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90% παρουσία ελευθέρου νερού στην επιφάνεια των φυλλών) για περισσότερες από 2-3 ώρες ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30 °C)
3. Το Ortiva είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το Ortiva για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
4. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το Ortiva 25 SC να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αγγούρι, Πεπόνι, Τομάτα, Κολλοκύθι, Καρπούζι, Πιπεριά, Φραούλα: 3 ημέρες. Αγκινάρα: 7 ημέρες. Καρότο: 10 ημέρες. Κρεμμύδι, Σκόρδο: 14 ημέρες. Ζαχαρότευπλο: 30 ημέρες. Ψαράγγι: - Ρύζι: 28 ημέρες. Σιτάρι: 35 ημέρες. Ελαοκράμβη: 21 ημέρες. Φασόλι, μπίζελι, μπρόκολο, κουνουπίδι: 14 ημέρες.

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Για αγγούρι (Υ+Θ), πεπόνι (Υ+Θ): 3, μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες, για το όδιο και μεσοδιάστημα 5-7 ημέρες για τον περονόσπορο. Για τομάτα (Υ+Θ), κολλοκύθι (Υ+Θ), καρπούζι (Υ+Θ), πιπεριά (Υ+Θ): 3, μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Για αγκινάρα: 3, μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Για καρότο: 3, μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Για κρεμμύδι: 3, μεσοδιάστημα 6-8 ημέρες. Για σκόρδο: 3, μεσοδιάστημα 14 ημέρες. Για φραούλα: 3, μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες. Για ψαράγγι: 3, μεσοδιάστημα 10-12 ημεροεβδομάδες. Για ζαχαρότευπλο: 2, 21 ημέρες. Για ρύζι: 1 εφαρμογή. Για σιτάρι: 2, μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Για φασόλι, μπίζελι: 2, μεσοδιάστημα 14 ημέρες. Για μπρόκολο, κουνουπίδι: 2, μεσοδιάστημα 12 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των προϊόντων και τα σκευασμάτα:

Τα υλικά σκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή ή οκτώμη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Οδηγίες αποθήκευσης:

Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον αν διατηρηθεί στην αρχική του σκευασία χωρίς να ανοιχθεί, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προβλέπεται το σκεύασμα από τον παγέτο.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:

