

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώετε, μην πίνετε ή καπνίζετε •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα •Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής •Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει •Οι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό •Το υλικό και ο περιεκτής του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήσιο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
•**Γενικά:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλή εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασεως καλέστε αμέσως γιατρό.
•**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
•**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
•**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην χορηγώσετε σιδήρητες εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
•**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρ. ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Όλιθο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Περωνόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	200 - 250	200 - 250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:
• Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
• Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

L176889 GREC/11R



Ortiva Opti®

8/40 SC

syngenta®

Azoxystrobin (αζοξυστρομπίν)
(ομάδα στρομπιλουρινών)
Chlorothalonil (χλωροθαλονίλ)
(ομάδα χλωρονιτριλιδών)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60265 / 11-2-2010

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin: 8% β/ο +
Chlorothalonil: 40% β/ο +
Βοηθητικές ουσίες: 59,88% β/β

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική
δράση κατά διάφορων μυκητολογικών
ασθενειών.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
- Υποπτο καρκινογόνεσης
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 3 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Συνδιαστικότητα: ---.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα μπτόνια ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος Δράσης:

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο προστατευτικό με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας. Το chlorothalonil είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαισθητών μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργίες και δόσεις εφαρμογής. Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι' αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιάς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργεία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλή αεριζόμενο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: