

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Αποφύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παύοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ατυχήματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να προημερίσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσουν.

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να ακολουθήσετε τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου:

- για τις λοιπές καλλιέργειες: είτε να αφήνετε μια αμέσαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά είτε εναλλακτικά να χρησιμοποιείται ακροφύσιο μείωσης της διασποράς (LDN) που επιτυγχάνουν μείωση της διασποράς κατά 50%.

• Μην εισέρχετε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα ή τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια»

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

L178007 GREC/1S PPE 4034524



Ortiva Top®

20/12,5 SC

syngenta®

ΠΡΟΣΟΧΗ



Azoxystrobin (αζοξυστρομπιν)
(Ομάδα στρομπιλουρίνων)
Difenoconazole (νιφενεκοναζόλη)
(Ομάδα τριαζολών DMIs)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Γεωργ.: 60400/24-01-14

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin 20% β/ο
Difenoconazole 12,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 69,3% β/β

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική
δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών
ασθενειών.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίδος, Τηλ.: 231 0796940-3

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Τρόπος δράσης: Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρίνων, είναι προστατευτικό με μερική διεσπαστική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των спорίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των спорίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας. Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, και είναι αποσβεστικό σε μεγάλο εύρος παθολογικών μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνίσταται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C⁴ κατά την διαδικασία βιοσύνθεσης της ερροστερόλης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμασι καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκάστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόδοση του φυτο-προστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες, μπουκάλια), ξεπλένονται υπό πλεον με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή πλύση με νερό του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Προβλεπεί για τους χειριστές. Να φοράτε γάντια και προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνιες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμπτωμάτων: • Να μην χρησιμοποιείται σε φυτώρια. • Να μην χρησιμοποιείται σε διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων από τη σπορά φυτεύση. • Να μην εφαρμόζεται σε περιόδους έντονης υγρασίας ή σε συνδυασμό με ορμόνες ανάπτυξης.

Διαχείριση ανεπιθύμητων: • Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12,5 SC ρηθνητικά ή πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφυγείτε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

• Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12,5 SC σε προληπτικά ψεκάσματα με ενίσχυση με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs (στρομπιλουρίνες) και τους DMIs (τριάζολες) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανεπιθύμητη. • Μείνιτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια περίοδο 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

Χρονικά διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκάστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πρέπει να εισέλθει αμέσως μετά τον ψεκασμό, πρέπει να φορά γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. **Χρονικά διαστήματα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° C.



Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME logo and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

TM

approx. measure

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στα πεπόνια και τομάτες και συγκριμένα στις ποικιλίες Hugo, Deneb για τα πεπόνια και Saladar για την τομάτα, παρατηρήθηκε μια ευαισθησία, η οποία όμως δεν εμπόδισε την ανάπτυξη ή την παραγωγή. Προτείνεται μια μικρή δοκιμή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος για τις καλλιέργειες της τομάτας και πεπονιού. Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με ORTIVA TOP, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α), Αγκινάρα, Μπιζέλι, Φρέσκο κρεμμυδάκι: 7 ημέρες. Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Α), Κολλοκύθι (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ): 3 ημέρες. Καρότο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σέλινο, Μάιντανος (Α), Σκόρδο: 14 ημέρες. Λάχανο, Πράσο: 21 ημέρες. Ρύζι: 28 ημέρες. Σπαράγγι: δεν ορίζεται.

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: μπρόκολο, σέλινο, πράσο, σπαράγγι, μπιζέλι, μαιντανός, αγκινάρα, κρεμμύδι χλωρό, σκόρδο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

Πάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ σκ. / 100 λίτ ψεκ υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i> <i>Helminthosporium</i> sp.	80-100	—	20-40	Ψεκασμός BBCH 47-61	1-2 εφαρμογές με 15 ημέρες μεσοδιάστημα Η πρώτη εφαρμογή στο BBCH 47-51, και η δεύτερη εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητη στο BBCH 57-61
Μπρόκολο (ίσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Alternaria brassicae</i>	100	—	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	1 εφαρμογή
Κουνουπίδι	<i>Alternaria brassicae</i>	100	—	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	1 εφαρμογή
Λάχανο	<i>Alternaria brassicae</i>	100	—	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	1 εφαρμογή
Σέλινο (ίσσοнос σημασίας χρήση)	<i>Septoria apii</i>	100	—	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-48	1 εφαρμογή
Αγγούρι (Α)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-89	1 εφαρμογή
Κολλοκύθι (Α)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-89	1 εφαρμογή
Τομάτα (Α)	<i>Alternaria</i> spp. <i>Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-87	1 εφαρμογή
Μελιτζάνα (Α)	<i>Oidium neolyopersici</i> (ίσσοнос σημασίας ασθένεια)	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-87	1 εφαρμογή
Τομάτα (Θ)	<i>Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-87	1 εφαρμογή

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ σκ./ 100 λίτ ψεκ υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μελιτζάνα (Θ)	<i>Leveillula taurica</i> <i>Oidium neolycopersici</i> (ήσσονος σημασίας ασθένεια)	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-87	1 εφαρμογή
Πιπεριά (Θ)	<i>Leveillula taurica</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-87	1 εφαρμογή
Πράσο (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	–	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-45	1 εφαρμογή
Σπαράγγι (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Puccinia asparagi</i>	100	–	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-89	1 εφαρμογή
Μπιζέλι (αρακάς) (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Ascochyta blight</i>	100	–	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 59-77	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Μαϊντανός (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Septoria apii</i>	100	–	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-49	1 εφαρμογή
Πεπόνι (Α/Θ)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Cladosporium cucumerinum</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-89	1 εφαρμογή
Καρπούζι (Α/Θ)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Cladosporium cucumerinum</i>	100	100	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-89	1 εφαρμογή
Αγκινάρα (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	100	–	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-55	1 εφαρμογή
Κρεμμύδι χλωρό (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	–	30-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-49	1 εφαρμογή
Σκόρδο (ήσσονος σημασίας χρήση)	<i>Alternaria porri</i> <i>Puccinia allii</i>	100	–	30-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 41-45	1 εφαρμογή
Καρότο	<i>Alternaria dauci</i>	100	–	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 40-49	1 εφαρμογή