




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση των τετρανύχων και του αλευρώδη σε καλλιέργειες κηπευτικών θερμκηπίου και των τετρανύχων στα καλλωπιστικά θερμκηπίου. Δρά κυρίως εξ' επαφής και σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπιδίων. Το Oberon 240 SC είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον των νεαρών σταδίων των καταπολεμούμενων εχθρών των οποίων ο θάνατος επέρχεται μετά την παρέλευση 3-10 ημερών από την εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

• **Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκυθάκι-Πεπριά-Μελιτζάνα (Θερμκηπίου):** Αλευρώδεις (*Trialetrodes varariorum*, *Bemisia tabaci*), Τετρανύχος (*Tetranychus spp.*). Δόση*: 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (60-90 κ.εκ./στρέμμα)

• **Πεπόνι-Φασόλι-Φρούλα (Θερμκηπίου):** Αλευρώδεις (*Trialetrodes varariorum*, *Bemisia tabaci*), Τετρανύχος (*Tetranychus spp.*). Δόση*: 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (40-60 κ.εκ./στρέμμα)

• **Ογκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

• **Καλλωπιστικά (Θερμκηπίου):** Τετρανύχος (*Tetranychus spp.*). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (60 κ.εκ./στρέμμα)

• **Ογκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Παρατήρηση*: Στις περιπτώσεις όπου στο θερμοκήπιο υπάρχει μόνο τετρανύχος να εφαρμόζεται μικρότερη δόση.

Χρόνος εφαρμογής: (τομάτα - αγγούρι - κολοκυθάκι - πιπεριά - μελιτζάνα - πεπόνι - φασόλι - φρούλα - καλλωπιστικά θερμκηπίου). Με την εμφάνιση της προσβολής στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του πληθυσμού. Για καλύτερα αποτελέσματα οι εφαρμογές να στοχεύουν στα νεαρά στάδια των εχθρών - στόχων. (Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες).

ΜΕΤΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (τομάτα - αγγούρι - κολοκυθάκι - πιπεριά - μελιτζάνα - πεπόνι - φασόλι - φρούλα - καλλωπιστικά θερμκηπίου): 4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Φασόλι, Φρούλα: 3 ημέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές: Διαχείριση ανθεκτικότητας: για την πρόληψη ή καθυστέρηση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του τετρανύχου και του αλευρώδη στο Oberon 240 SC συστήνεται η ακόλουθη στρατηγική:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.
- Οι εφαρμογές να γίνονται με τη συνιστώμενη δόση και μεσοδιάστημα.
- Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φυλλών με το ψεκαστικό υγρό.
- Το Oberon 240 SC να εφαρμόζεται μέχρι 4 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος με την μέθοδο της εμβάτιζόμενης αντικειμενοφόρου πλάκας των πληθυσμών εχθρών / στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

• Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Προφυλάξεις για την ασφαλή εφαρμογή του Oberon 240 SC σε προγράμματα IPM στα θερμοκήπια:

Εξαπλώνει αρπαστικών ακάρεων και εντόμων να γίνεται αφού μεσολαβήσουν 2-3 εβδομάδες από τον ψεκάσμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για την ασφαλή χρήση του Oberon 240 SC στα καλλωπιστικά πρέπει να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή πριν την εκτεταμένη χρήση του.

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



120 κ.εκ. Ε

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγ. σύνθεση: Spiromesifen 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,32% β/β

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14256/2-6-2008

ΧΙ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εκτελούν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκάσμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος σε πλάγια (πλευρική) θέση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Πληροφορίες για το γιατρό - Θεραπευτική αγωγή: Απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΡΘΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

R02 6408 11



5200309 895696