

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Σε περίπτωση χρήσης του σε νέες ποικιλίες συνιστάται να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές σε λίγα φυτά, πριν την εφαρμογή του στην καλλιέργεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Πεπόνι (Υπαίθρου), Αγγούρι-Κολοκυθάκι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου): 3 ημέρες, Πατάτα, Μαρούλι: 7 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: —

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (α νερό του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.**
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για 2 χρόνια, αν αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.



Orvego®

30/22.5 SC

Ametoctradin/Dimethomorph
(αμετοκτραντίν/ντιμεθομόρφ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Ametoctradin 30% β/ο (ομάδα πυριμιδολαμινών),
Dimethomorph 22.5% β/ο (ομάδα μορφολινικά),
Βοηθητικές ουσίες 51.41% β/β.

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωμοκλήτων (περονόσποροι).

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60355 / 7-3-2013

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 800 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr.

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του ametoctradin, μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση και του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική και θεραπευτική δράση, το οποίο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των ωμοκλήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί κανονικού όγκου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (σε κ. εκ. σκευάσματος)

ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος στην αναφερόμενη καλλιέργεια** και **στο αγροτεμάχιο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 5-10 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 80-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Προσοχή:** Η δόση σκευάσματος ανά στρέμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 κ.εκ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος στην αναφερόμενη καλλιέργεια** και **στο αγροτεμάχιο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **ΜΑΡΟΥΛΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος στην αναφερόμενη καλλιέργεια** και **στο αγροτεμάχιο:** 2, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **ΑΓΓΟΥΡΙ – ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΠΕΠΟΝΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 80-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Προσοχή:** Η δόση σκευάσματος ανά στρέμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 κ.εκ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών εφαρμογών όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος στην αναφερόμενη καλλιέργεια** και **στο αγροτεμάχιο:** 2, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, ταχείας ανάπτυξης της βλάστησης ή υψηλής πίεσης της ασθένειας, συστήνεται η τήρηση των μικρότερων προτεινόμενων διαστημάτων μεταξύ των εφαρμογών.

ΕΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων:

- Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ή άλλα σκευάσματα που περιέχουν ametoctradin περισσότερες φορές από αυτές που ορίζονται ανά έτος για την κάθε καλλιέργεια και αγροτεμάχιο. Στον μέγιστο αριθμό των εφαρμογών ανά έτος να υπολογίζετε και τις καλλιέργειες αμειψισποράς.

- Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ευάλωτες περιοχές δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, αμυώδη εδάφη και χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Η είσοδος να επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

