

PANAREX 4 EC

Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ποθυετών και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στην καρβοξυλάση του ακετυλοσυνεζύμνου Α στην βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (inhibition of acetyl CoA carboxylase).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βαμβάκι Πατάτες Ζαχαρότευτλα Φασόλια Ξερά Μπιζέλια Ξερά Ηλιανθος Ελαιοκράμβη (χειμερινή) Τομάτα (υπαίθρου)	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: -Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>) -Νεραριάδα (στο βαμβάκι) (<i>Paspalum distichum</i>) -Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>)	250 200-250	Ψεκάσμος φυλλώματος μεταφυτρωτικό. Στάδιο ζιζανίων από 2-4 πραγματικά φύλλα μέχρι το τέλος του αεφωμάτος των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια και γίνουν ανταγωνιστικά σε αυτήν (BBCH 12-23). Μπορεί να εφαρμοστεί και μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου των ζιζανίων (BBCH 31). Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: -Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) -Ηρα (λεπτή και πολυάνθη) (<i>Lolium</i> spp.)	150	
	-Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> spp.) -Φάλαρη (<i>Phalaris</i> spp.) -Αιματογόχορτο (<i>Digitaria</i> sp.)	100-150	

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα ανά στρέμμα): 30-50
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα

Παρατηρήσεις

- Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση όταν τα ζιζάνια έχουν ξεπεράσει το προτεινόμενο στάδιο ανάπτυξης και σε περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας ζιζανίων.
- Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζεται στα ζιζάνια κατά τη ζωγή τους ανάπτυξη όπου αυξάνεται η δυνατότητα διακίνησης του προϊόντος στο φυτό.
- Τα ζιζάνια ελέγχονται αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε έδαφος με επαρκή εδαφική υγρασία.
- Για όλες τις καλλιέργειες πρέπει να εφαρμόζεται πριν την κάλυψη της καλλιέργειας από τα ζιζάνια και πριν αυτά γίνουν ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια
- Όταν επικρατούν κακές καλλιεργητικές συνθήκες, όπου τα ζιζάνια και η καλλιέργεια είναι κάτω από πίεση, που μπορεί να προκληθεί από παγετό, ξηρασία, ανεπάρκεια ινιστοαξιών, πλημμύρα ή έντονη μηχανολογική ή εντομολογική προσβολή και μπορεί να έχουμε μείωση στη δυνατότητα μετακίνησης του προϊόντος, τότε να μην εφαρμόζεται το προϊόν ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εφαρμογή του, να χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες προτεινόμενες δόσεις.

Οδηγίες για τη χρήση του PANAREX 4 EC: Μετά από δοκιμές συνάγεται ότι το προϊόν δεν έχει επίπτωση σε καλλιέργειες που προορίζονται για απορραπαγωγή ή για παραγωγή βολβών και η φυτρωτική ικανότητα είναι ίδια με του μάρτυρα.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά με ομοιομορφο ψεκάσμο του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα/ στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος χρησιμοποιείται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και ο μεγαλύτερος όγκος χρησιμοποιείται όταν έχουμε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων ή όταν τα ζιζάνια είναι σε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi). Μπρεκ τύπου σκούπα. Ο ψεκάσμος πρέπει να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φερακίου.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βύτιο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βύτιο. Απογεινίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Δεν απαιτείται για την εφαρμογή του η προσθήκη λαδιού ή επιφανειοδραστικού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Οι πλατύφυλλες καλλιέργειες μπορούν να επανασπαρουν αμέσως σε έδαφος που έχει εφαρμοσθεί το PANAREX, αλλά πρέπει να μεσολαήσει διάστημα 4 εβδομάδων από την εφαρμογή του για την επανασπορά αγρωστωδών καλλιεργειών (σιτηρά).

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη ερωστές πλατύφυλλες καλλιέργειες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- τομάτα υπαίθρου: 28 ημέρες
- βαμβάκι, πατάτα, ηλιανθος, ζαχαρότευτλα, φασόλια & μπιζέλια για όσπρια: 56 ημέρες
- χειμερινή ελαιοκράμβη: δε χρειάζεται να οριστεί εφόσον η εφαρμογή είναι στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
SZ₁ Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπάρους.
SZ₂ Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ₃ Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ₄ Μη ψεκάσετε όταν φυσάει.
SZ₅ Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις
SZ₁₁ Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.
SZ₁₂ Μετά το ψεκάσμο ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Πρώτες βοήθειες-Αντιδότη: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Διατηρείται σε δροσερό και καλά αερισμένο περιβάλλον. Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βθέπε φιάλη

PANAREX 4 EC

quizalofop-p-tefuryl
(κίζαλοφόν-π-τεφουρύλ) 4%

Εγγυημένη σύνθεση:
quizalofop-p-tefuryl 4% β/ο
βοηθητικές ουσίες 95,24% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
**Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
πολυετών και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων**



- Ερεθίζει το δέρμα.
- Υποπίπτει καρκινογένεσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7879/ 21-7-2008

Περιεχόμενο 5 λίτρα

Κάτοχος της έγκρισης: Chemtura Europe Limited
Kennet House, 4 Langley Quay, Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Εργοστάσιο συσκευασίας - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Κ.Λ. Ευθυμιάδης οβ.ε.ε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr