



CCL LABEL

ITALY

E C L S I S T E M I M U L T I P A G I N A

CCL Label S.r.l. - Via del Commercio, 2 - 20049 Concorezzo (MI) - Tel.: +39 039.60.43.565 - Fax: +39 039.60.42.962 - www.ccllabel.com

CLIENT BAYER GRECIA Date 8-MAY-13 approval _____

S P E C I F I C A T I O N S

PRODUCT PEARL 120ccCODE S03696213OPEN RIGHTPAGES N. 16PAGE SIZES h 45 x w. 166 mmFINISHED SIZES h. 45 x w. 198 mm

PLAIN SHEET SIZES _____

COLOURS N. 4UNWIND POSITION N. 8

1a proof

L A B E L

NOTE: INCIRC = specific booklet for round surface



Pearl

100EC

120 κ.εκ. 

Πολυκαταπονημένο υγρό (EC)
 Εγγ. σύνθεση deltamethrin 10% β/α,
 Βοηθ. ουσίες 89,34% β/β

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο
 επαφής και σπασμού για την αντιμετώπιση μυκήτων και μαστικών εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Εύφλεκτο.
- Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εξήριση δερμάτων ή ακαούσιο.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΔΑ
 14.025 / 12-04-2013

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΛ 100EC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεντρωμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: ●Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά: Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Λεκάνιο (*Saissetia oleae*)** Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** ● **Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά:** Αφίδες (*Hyalopterus spp.*), Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Laspeyresia pomonella*), Καρπόκαψα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*).

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα/στρ. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*). Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ: ●Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά:** Καρπόκαψα της μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*), Ψύλλα μηλιάς (*Psylla mali*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5* κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Φυλλοδέτεες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Ψύλλα αχλαδιάς (*Psylla pyri*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ●Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά:** Φυλλοδέτεες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*). Ανάρσια (*Anarsia lineatella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Ραγολέτιδα (*Rhagoletis cerasi*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 10-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ.

σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*). Καρπόκαψα της δομιασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. ● **ΑΜΠΕΛΙ**:** Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. (1η γενεά), 12,5-17,5 κ.εκ. (2η και 3η γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Κοχυλίδα (*Clysia ambiguella*). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Τζιτζικάρια (*Eupoecia* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. ● **ΦΡΑΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Αφίδες (*Aphis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. ● **ΕΛΙΑ:** Δάκος (*Bactrocera oleae*). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Λεκάνιο (*Saissetia oleae*). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Βαμβοκάδα (*Eurphyllura* spp.). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Πυρηνωτήτης (*Prays oleae*). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια

γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. (ανθόφ. γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. 12,5 κ.εκ. (καρπόφ. γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. **•Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρ. **•ΣΟΛΑΝΟΔΗ: Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. Βραιμούσα (*Nezara viridula*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-7,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **•Πιπεριά (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/στρ. Βραιμούσα (*Nezara viridula*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (*Trialetrodes vaporariorum*) Ψεκάσμος με

την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **●ΣΟΛΑΝΟΔΗ: Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα /στρ. Βρώμια (*Nezara viridula*). Ψεκάσμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/στρ. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: ●Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδες (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκάσμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Υπαίθρου: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ., Θερμοκηπίου: 7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθρου: 60-100 λίτρα/στρ., Θερμοκηπίου: 60-140 λίτρα/στρ. **●Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι (Υπαίθρου):** Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.) Ψεκάσμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **●Λόχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπράκολο:** Πιερίδα (*Pieris* spp.), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκάσμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα /στρ. Πλουτέλλα (*Plutella*

xylostella). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 125 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ. **•Μαρούλι (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*) Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Nasonovia ribis-nigri*, *Hyperomyzus lactucae*, *Aphis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 125 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού, (625-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 75-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **•Σπανάκι:** Αφίδες (*Aphis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαιέστρα (*Mamestra spp.*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 125 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ. **•Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι:** Αφίδες (*Aphis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαιέστρα (*Mamestra spp.*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 125 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 75-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ. **ΨΥΧΑΝΘΗ:** **•Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια:** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 75-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **•**

Μπιζέλια: Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*) Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*) Θρίπας (*Thrips angusticeps*) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **•Αγκινάρα:** Κασσίδα (*Cassida spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Προντόνια (*Spodoptera litura*) Αφίδες (*Anuraphis cardui*, *Myzus persicae*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **•Πατάτα:** Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρ. **•Βαμβάκι:** Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*) Τζιτζικάρια (*Empoasca spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*) Αφίδα (*Aphis gossypii*) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **•Κορνός:** Θρίπας (*Thrips tabaci*) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*)

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ. **●Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλα, Παντζήρι:** Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*), Μύγα των τεύτλων (*Pegomya* spp.), Άλτης (*Chaetocnema tibialis*) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ. **Κασσίδα** (*Cassida nebulosa*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ. **●Αραβόσιτος ***:** Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρ. *Diabrotica virgifera*. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρ. **ΣΙΤΗΡΑ: ●Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη:** Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα/στρ. **●Μηδική:** Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*) Φυτονόμος (*Hypera postica*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40 λίτρα/στρ. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Αφίδες (*Myzus* spp.) Θρίπες (*Thrips tabaci*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ. Αλευρώδης (*Trialetodes vaporariorum*) Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών

S03696213_PEARL 120cc - 1a proof

με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα /στρ. Φυλλοδέττες (*Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.*) Ψεκασιός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (4,375-8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 12,5 κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 12,5 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.** *** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. ******* Η εφαρμογή του Pearl 100 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ● Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. ● Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. ● Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. ● Να

αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με PEARL 100EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. ●Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικεμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. ●Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά), Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλα, Παντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σπανάκι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, **ΨΥΧΑΝΘΗ:** (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια), Μπιζέλια, Βαμβάκι, Μηδική: 2 ●**Αμπέλι,** Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, **ΣΩΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** Υπαίθρου και Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι), Μαρούλι (Υπαίθρου), Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσπικος, Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 3. **ΣΩΛΑΝΩΔΗ:** Θερμοκηπίου (Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα): 4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: ●Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσπικος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30 ημέρες ●Μηδική: 14 ημέρες ●**Αμπέλι,** Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο,

Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά: 7 ημέρες • Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μοϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Αγκινάρες, Σπανάκι: 3 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Ημερ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ●Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ●Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ●Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. ● Μην αναπνέετε εκνεφώματα. ● Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ●Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ●Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. ●Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.●Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. ● Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης E ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύντε το στόμα με νερό. Κρατήστε σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπευτικά μέτρα: Επιτόπιος χειρισμός: Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία, για παιδιά 25 μg ενδοφλεβίως. **Αντενδείξεις:** Ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. •Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επικρατικά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. •Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

•ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή / και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

- Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.



Διανομέας K&N Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
8^η Εφόδος, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος
Τηλ κέντρο: 2310 988656, FAX: 2310 798423

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



S 03 6962 13



Pearl

100EC

120 κ.εκ. e

Παλακτωματοποίηση υγρό (EC)
Εγγ. σύνθεση: deltamethrin 10% β/ο,
βοηθ. ουσίες 89,34% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυητικών και μασσητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Εύφλεκτο.
- Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα δέρματος ή ακάσμη.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΑΔΑ:
14425 / 12-04-2013

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE

S03696213_PEARL 120cc - 1a proof

glued