

Permit®

75WG

Halosulfuron-methyl (Χαλσοσουλφουρόν-μεθύλ) 75%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

PERMIT:
Το **Permit®** είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του halosulfuron-methyl οφείνεται στην αναστολή της δράσης του ενζύμου της οξειδιοακτικής συνθέσεως, που προκαλεί ανόχευση της ανάπτυξης, που οδηγεί στην ξήρανση του φυτού. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις ποικιλίες ρυζιού (ινδικές και γιαπωνέζικες) και σε ξερικές και κατακλυσμένες καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το **Permit®** μπορεί να εφαρμοσθεί σε ξηρά-υγρά τηγάνια και σε τηγάνια με ελάχιστο νερό, μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας.
α) Τηγάνια με ελάχιστο νερό: Χρησιμοποιείτε το **Permit®** σε ομοιόμορφα κατακλυσμένους ορυζώνες έως 5 κ.εκ. νερό (το μέγιστο). Μετά την εφαρμογή, το νερό πρέπει να διατηρείται σταθερό για 2 τουλάχιστον ημέρες, χωρίς να γίνει καμιά νέα εισαγωγή νερού. Σε απορροφητικά εδάφη, όπου υπάρχει διήθηση, είναι προτιμότερο να στραγγίζεται ο ορυζώνας, πριν γίνει καινούρια εισαγωγή νερού.
β) Τηγάνια υγρά-ξηρά: Χρησιμοποιείτε το **Permit®** σε ορυζώνες που μόλις έχουν αποστραγγισθεί και το έδαφος είναι καλά διαβρεγμένο. Το γέμισμα των τηγανιών με καινούριο νερό, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Στη συνέχεια, γίνεται η διαχείριση του νερού διατηρώντας την καλλιέργεια σε κατάκλυση για 2 τουλάχιστον εβδομάδες πριν το πιθανό άδειασμα.
γ) Ορυζώνες με ξηρά απορμένο ρύζι: Το **Permit®** εφαρμόζεται με την ίδια δοσολογία και τις ίδιες εποχές επέμβασης, που συνιστώνται για τις περιπτώσεις απορμένο σε υγρά τηγάνια.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το προϊόν πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του νερού ή της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/2 του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπολοίπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορροπαντικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση αμμωνίας 0,03%), διατηρώντας τον αναδευτήρα σε λειτουργία για περίπου 15 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Τα φίλτρα και τα μπεκ, πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαρισθούν ξεχωριστά, με το ίδιο διάλυμα αμμωνιακού απορροπαντικού.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
PYZI: Ρογάδι (*Scirpus maritimus*), Σκίρνος (*Scirpus mucronatus*), Μοσχοκύπερη (*Cyperus diformis*), Κίτρινη κύπερη (*Cyperus esculentus*), Πεντάνευρο ρυζιού (*Ailanto plantago-aquatic*), *Bidens spp.* Ελέγχει ικανοποιητικά το ζιζάνιο *Heteranthera spp.* στο στάδιο ροζέτας. Δόση: **3-5 γρ./στρ.** με 20-40 λίτρα νερό/στρ. Εφαρμογή 20-50 ημέρες μετά τη σπορά, από τα 2-4 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι το μέσον του αδεφώματος (BBCH 12-24).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργτική περίοδο: Μία (1).

Permit®

75WG

Halosulfuron-methyl (Χαλσοσουλφουρόν-μεθύλ) 75%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1) Η καλύτερη αποτελεσματικότητα του προϊόντος επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων και όταν αυτά βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη. **2)** Ελέγχει ικανοποιητικά το ζιζάνιο *Heteranthera spp.*, ειδικά στο στάδιο της ροζέτας και όταν τα φύλλα δεν έχουν βγει από την επιφάνεια του νερού. Παρόλα αυτά, και λόγω ιδιαιτεροτήτων του ζιζανιού, μπορεί να παρατηρηθούν αναβλαστήσεις. **3)** Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο. **4)** Δεν πρέπει να γίνεται επέμβαση σε ρύζι που βρίσκεται σε κατάσταση στρες λόγω αντιξοών καιρικών συνθηκών, λόγω προσβολών από ασθένειες ή έντομα, κ.τ.λ. **4) Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα από άλλες χημικές ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης, για να αποφευχθεί η εξήλωση ανθεκτικών βιοτύπων των στοχευμένων ζιζανίων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν παρουσιάζει καμμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στην ετικέτα του προϊόντος και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα Aura 20EC, Basagran 48SL και Clincher 200EC. Σε περίπτωση συνδυασμών, διαλύστε πρώτα το **Permit®** και στη συνέχεια τα άλλα σκευάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακκούλες και οι σάκκοι, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του απαράβλαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Permit®

75WG

Halosulfuron-methyl (Χαλσοσουλφουρόν-μεθύλ) 75%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Halosulfuron-methyl** 75% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 22,7% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 7916/27.02.2009
Ημερ. Λήξης: 27.02.2012

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες



★ NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρατε τον παθόντα σε χώρο καλά αεριζόμενο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ν

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



01/2009-3

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 200 γρ.