

**FARMA - CHEM SA**

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047

http://www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ****ΠΡΟΪΟΝ:**
PLINTO 2,5 EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων.

Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 2,5% β/ο δραστική ουσία (Esfenvalerate) και βοηθητικές ουσίες 97,05%. Περιέχει ως διαλύτη aromatic partha (πετρέλαιο).

Κάτοχος της έγκρισης: AFRASA S.A.**Διανομή:** FARMA-CHEM S.A.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ. (min-max)		
ΑΜΠΕΛΙ	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	40 – 60	40 - 120	50 - 100	Έναρξη εφαρμογής με την εμφάνιση της προσβολής και ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων σε παγίδες και την εκκόλαψη των αυγών.	2/15 ημ.
	Πυραλίδα (<i>Sparganothis spp.</i>)				Έναρξη εφαρμογής με την εμφάνιση των προνυμφών.	
ΤΟΜΑΤΑ αγρού	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Κάμπιες λεπιδοπτέρων - noctuidae (<i>Autographa gamma</i>)	40 - 60	--	80 - 120	Έναρξη εφαρμογής με την εμφάνιση της προσβολής και ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων σε παγίδες παρακολούθησης	2/15 ημ.
Παρατηρήσεις: 1. Στο Αμπέλι η μικρή δόση εφαρμόζεται με το μεγάλο όγκο ψ.υ. και η μεγάλη με το μικρό όγκο ψ.υ., ώστε να μη γίνει υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης/στρ. 2. Σε αγρούς με χαμηλή προσβολή ή κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης των εχθρών, χρησιμοποιείτε την						

χαμηλή δόση 40 κ.εκ./ στρ.

3. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζεται στα πρώιμα στάδια προσβολής.
4. Όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή εάν αναμένεται βροχή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να μην γίνονται πάνω από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην επιτρέπεται η είσοδος στον αγρό μέχρι να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αμπέλι: 14 & Τομάτα: 3.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή και απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες < 5°C.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.