

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτοφρές. •Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Κάντε πλύση στομάχου και χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής** βάλτε τον παθόντα να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΑΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΔΥΣΜΕΙΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΞΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΑΝΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΕΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΛΟΔΕΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΛΦΟΡΔΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΙΑ, 20 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Ή ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΚΥΨΕΛΕΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΥΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΣΙΑΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΥΕΤΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

ΔΙΑΚΕΡΙΞΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμωγών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. •Εφαρμογές μόνον όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμωγές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε ενυδατημένα με έντομη ομίχλη από όλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. •Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εντόμων-στόχων με τη χρήση μέρους της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. •Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμωγές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελαιότητα επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Επεριφθορική-Βαμβάκι-Ελαιοκαρύδι-Σαγκροαρότεπλο-Σίταρι-Κριθάρι-Αραβίδατος: 30 ημέρες, Μηλίδα 15 ημέρες, Σόγια 14 ημέρες, Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Αμπέλι-Ελιά-Κρεμμύδι-Λάχανο-Βρασί-Κουκι-Μπιζέλι-Πράσο-Τατιάτα -Καπνός: 7 ημέρες, Φαρούλα-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Μαρούλι-Σπανάκι-Σέλινο-Ρόκα-Αγκινάρα-Σπαράγγι -Μανιτάρια -Καρότο: 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι κενές φιάλες σκευασμάτων φυλάσσονται υπό πίεση με ειδικό ελαστικό ή γίνεται τριπλό έκπλυμα (τα νερά του έκπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προληπτικώς με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αποσυνδυαστούν όλα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται το στην αρχική, απαραιστώτη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΤΗΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:



ΥΨΙΛΟΝ®

POLECI 2,5EC

Εντομοκτόνο

Deltamethrin (Ντελταμεθρίν) 2,5% Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Deltamethrin 2.5% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 97,13% β/β
Περιέχει αρωματικό διαλύτη Νάφθα

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14408/10.12.2012

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ
ΒΛΑΒΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΞΙΓΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΑΣΕΙ ΕΥΑΣΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΑΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.

Κάτοχος της άδειας: **Sharda Europe b.v.b.a** - Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **SHARDA BALKAN Μονοπρόσωση ΕΠΕ**
Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6890144

Διανομέας :



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλυνίου 32, Βούλαργα, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
ypsilon-agro@ypsilon-agro.com, www.ypsilon-agro.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Poleci 2,5 EC: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων, Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος,

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΞΙΠΕΡΟΙΔΕΙΑ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκράφι Φρουτ, Νεράτζι): Αφίδες, δόση: **30-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Λεμόνι, Μύγα Μεσογείου, Αλευρώδης, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά):** Καρποκάφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα, Ανθομόνος, Μηλοκόνη, Κηροδόμμεγες, Θρίπες, δόση: **30-50* κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Φυλλοδέστες, δόση: **35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Ψύλλα Αχλαδιάς, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, Ψύλλα Σαν Ζοσέ, δόση: **50-75 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά):** Καρποκάφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα, Ανθομόνος, **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά):** Φυλλοδέστες, Ανάσρα, δόση: **35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Ραγολέπια ή μύγα κερασιά, δόση: **40-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Μύγα Μεσογείου, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται το καλοκαίρι κατά κητών μυρμηών, **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά):** Φυλλοδέστες, Ανάσρα, δόση: **35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Ραγολέπια ή μύγα κερασιά, δόση: **40-50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Μύγα Μεσογείου, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΕΛΙΑ** Δάκος, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες: Λακάνο, Θρίπες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, Πυρηνόστιπες, δόση: **30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό** (ανθόβλα), **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό** (Καρθήρι), Εφαρμόζεται στην έναρξη της ανθίσης (ανθόβλα γενικά) και αμέσως μετά την καρποδέση (καρθήρι γενικά) μεταξύ ωοθηκών και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις φερομονικές παγίδες, **ΦΡΑΓΟΥΛΙΑ** Αφίδες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**. Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΚΡΕΜΜΥΔΙ-ΠΡΑΣΟ-ΚΑΡΟΤΟ** Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Κορποσκούληκα, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου)-ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου):** Πρόσνο σκαυλήκι, Σποντόπτερα, Δορυμφόρος, Αφίδες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Βρομοσούδες, δόση: **30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Αλευρώδης, δόση: **70 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό** (θερμοκηπίου), Κορποσκούληκα, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** (υπαίθρου). Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής, **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου):** Πρόσνο σκαυλήκι, Σποντόπτερα, Δορυμφόρος, Αφίδες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Βρομοσούδες, δόση: **30 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, **ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Πρόσνο σκαυλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Κορποσκούληκα, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** (υπαίθρου). Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΛΑΧΑΝΟ** Πιερίδα, Μαμεστέρα, Πλούδια, Πρόσνο σκαυλήκι, Σποντόπτερα, Κορποσκούληκα, Αφίδες, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** Πικουλάκια, δόση: **50 κ.εκ/στρ.** Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου):** Πρόσνο σκαυλήκι, Σποντόπτερα, Άλτρες, Αφίδες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Κορποσκούληκα, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΣΠΑΝΑΚΙ** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμεστέρα, Άλτρες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Κορποσκούληκα, δόση: **35 κ.εκ/στρ.** Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα, **ΣΕΛΙΝΟ-ΡΟΚΑ** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμεστέρα, Άλτρες, δόση: **50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό**, Κορποσκούληκα, δόση: **30-50 κ.εκ/στρ.** Εφαρμόζεται μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.

Δόσεις ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):
Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκράφι Φρουτ-Νεράτζι-Αμπέλι-Μπιζέλι-Αγκινάρα-Σπαράγγι-Μανιτάρια: 100, Βερκοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Κερασιά-Δαμασκηλιά-Ελιά-Μηλιά-Αχλαδιά: 100-140 (Ψύλλα Αχλαδιάς-Ψύλλα Σαν Ζοσέ: 100), Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα (Υπαίθρου)-Πιπεριά (Θερμοκηπίου)-Αγγούρι(Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 60-100 (Υπαίθρου) 60-140 (Θερμοκηπίου), Τομάτα-Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): 60-100 (Θερμοκηπίου), 60-140 (Θερμοκηπίου), Σπινάκι-Σέλινο-Ρόκα: 70, Φαρούλα-Κουκι-Τατιάτα-Αραβίδατος: 60, Φαρούλα-Μαρούλι (Υπαίθρου) -Καπνός-Καλλιεργητικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου, Φυτάρια): 50-100 (Αλευρώδης: 70), Λάχανο-Σαγκροαρότεπλο: 50, Βαμβάκι: 30-50, Κρεμμύδι-Πράσο-Καρότο: 40-50, Μηλίδα-Σόγια-Ελαιοκάρβι: 40, Σίταρι-Κριθάρι: 20-40.

Μέγιστες αθροισ. εφαρμωγών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμωγών:
Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκράφι Φρουτ-Νεράτζι-Βερκοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Κερασιά-Δαμασκηλιά-Ελιά-Μανιτάρια-Σαγκροαρότεπλο: 1, Μηλιά-Αχλαδιά: 2/14 (Ψύλλα Σαν Ζοσέ: 1), Λάχανο-Σπανάκι-Σέλινο-Ρόκα-Φαρούλα-Κουκι-Μπιζέλι-Βαμβάκι-Μηλίδα-Σόγια-Ελαιοκάρβι: 2/14, Αμπέλι-Φαρούλα-Κρεμμύδι-Πράσο-Καρότο-Τατιάτα: 3/14, Αγγούρι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)-Μαρούλι (Υπαίθρου)-Αγκινάρα-Σπαράγγι-Καπνός-Καλλιεργητικά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου, Φυτάρια): 3/7, Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα: 3/7 (Υπαίθρου) 4/7 (Θερμοκηπίου), Αραβίδατος: 3/7-14, Σίταρι, Κριθάρι: 1-2/21.

Παρατηρήσεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευασματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα), έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευασματος στο στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμειλοφυλών στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
***Η εφαρμωγή του προϊόντος στον αραβότο οδηγεί στη μείωση των επιδόσεων των μυκοσπόριων, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp.