

Polyram® WG

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Προλαβαίνει την ανάπτυξη της ασθένειας καταπολεμώντας το μύκητα κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκβλάστησης των σπορίων πριν να εισχωρήσει στο φυτικό ιστό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ (αναφέρονται σε γραμμάρια σκευάσματος)

ΜΗΛΙΑ: Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Φουζικλάδιου** (*Venturia inaequalis*). Δόση: 133-250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, της ροδίνης κορυφής και μετά την άνθηση. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες επανάληψη των ψεκασμών κάθε 7 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα: 200 γρ. *

ΑΧΛΑΔΙΑ: Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Φουζικλάδιου** (*Venturia pirina*) και του **Στεμφύλιου** (*Stemphyllium vesicarium*). Δόση: 133-250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, της ροδίνης κορυφής και μετά την άνθηση. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες επανάληψη των ψεκασμών κάθε 7 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα: 200 γρ. *

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Plasmopara viticola*). Δόση: 160-200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί που ξεκινούν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. (5 φύλλα). Οι ψεκασμοί συνεχίζονται μέχρι και το στάδιο της ανάπτυξης των ραγίων και όχι αργότερα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Phytophthora infestans*). Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Pseudoperonospora cubensis*). Δόση: 180 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΠΕΠΟΝΙ (υπαίθρου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Pseudoperonospora cubensis*). Δόση: 180-200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Bremia lactucae*). Δόση: 120-200 γρ./στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΠΑΤΑΤΑ: Συνιστάται για την καταπολέμηση του **Περονόσπορου** (*Phytophthora infestans*). Δόση: 180 γρ./στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

- * Ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο όγκο ψεκαστικού, η μέγιστη δόση σκευάσματος/στρέμμα δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται.
- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προεδιοπονήσεων.

Polyram® WG

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών. Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά: 21 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 56 ημέρες.
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 7 ημέρες.
Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου): 3 ημέρες.
Μαρούλι (υπαίθρου), Πατάτα: 14 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Οι ποικιλίες της αχλαδιάς *Butlira d' Estate*, *Coscia*, *Conference*, *Gentil Bianca*, *S. Maria* και *Spadona* πιθανόν να είναι ευαίσθητες στο Polyram® WG και για αυτό συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή του σκευάσματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (δηλαδή σε< 30°C) και το άμεσο ηλιακό φως.



The Chemical Company

Polyram® WG

Metiram (μετιράμ)

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Metiram 70% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

Βοηθ. ουσίες: 16,7% β/β

Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 60316/4-4-2012

Περιεχόμενο: **800** γραμ.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860 130, www.basf-agro.gr

* Σήμα κατατεθέν της BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.
- Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης,** να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής,** φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** για τα μηλοειδή και **5 μέτρων** για το αμπέλι από τα επιφανειακά ύδατα.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

