

Εντομοκτόνο
2.5 WG
PRETOR



Εντομοκτόνο
PRETOR 2.5 WG
Πρετόρ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήμα εφαρμογών
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ/ στρέμμα (min-max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινία)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>), Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>)	40	40-60	100-150	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2/15
ΠΑΤΑΤΑ	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)		60 40	50-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2/15



Εντομοκτόνο
PRETOR 2.5 WG
Πρετόρ

Τρόπος δράσης:
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: --
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το PRETOR 2.5WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστώσουν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Ροδακινιά-Νεκταρινιά: 7 ημέρες/Πατάτα: 15 ημέρες



Εντομοκτόνο
PRETOR 2.5 WG
Πρετόρ



Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Lamda cyhalothrin 2,5%

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: lamda cyhalothrin 2,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,44 % β/β

Ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση δι επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για μυζητικά και μασητικά έντομα σε διάφορες καλλιέργειες.
Αρ. Έγκρ.Κυκλ.: 14.395/16.05.2012

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

Κάτοχος της έγκρισης:
CHEMINOVA AGRO SA,
Paseo De La Castellana 257, 5o - 28046, Madrid, Spain
Tel: +34 915 530 104 Fax: +34 915 538 859
E-mail: Virginia.gil-albert@cheminova.com

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία, σήμανση και διάθεση:
ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Οδικής Εταιρείας 3, 144 52,
Μεταμόρφωση, Αθήνα
Τηλ.: 210 2836440, Fax : 210 2836240



Διανορείς:
ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ.: 2310 311377, Fax: 2310 334378

Καθαρό Βάρος: 400 γραμ.



Εντομοκτόνο
PRETOR 2.5 WG
Πρετόρ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
• Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα του θυμώτος με νερό (μόνο αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του). Να μην προκαλέσει εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 10-15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Οδηγίες για το γιατρό:** Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για περαιτέρω πληροφορίες.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κομμάτια που θα καταστραφούν προηγούμενος με σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό αυτό και ο περιεχτής του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την εκκένωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/εγχειρίδιο δεδομένων ασφαλείας. Μη μολύνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μια ημέρα εξουλοκλίνοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν κυψέλες.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να οφιστεί πριν από την λήψη προστασίας 30 μέτρων από τα εμφανιστικά ύδατα για τις δεινυδρικές καλλιέργειες 20 μέτρων για τις πατάτες. Για να προστατέψετε τα μη σπορευόμενα αρθρόποδα να οφιστεί πριν από την λήψη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δεινυδρικές καλλιέργειες και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες. Επικοινωνήστε πριν την χρήση με τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνα μην την χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας όσων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα υδάνη πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεραζόμενο χώρο στην αρχή του απορριβόσιμου σκευάσματος. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

