



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Φυτώρια Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά): Για αφίδες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Για φυλλοκνίστη με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί κυρίως στην νέα βλάστηση το καλοκαίρι με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/ στρέμμα.

Εσπεριδοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για αφίδες, φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής νωρίς την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διάγνωση των οφθαλμών έως την πτώση των πετάλων - όγκος ψεκαστικού υγρού 200 λίτρα/ στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για αφίδες, φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/ στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά): Για αφίδες, φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού για πυρηνόκαρπα 100-150 για Δαμασκηλιές 100 λίτρα/ στρέμμα.

Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού στον αγρό 50-100 στο θερμοκήπιο 100-170 λίτρα/ στρέμμα.

Μαρούλι (υπαίθρου-θερμοκηπίου): Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

Πεπόνι υπαίθρου: Για αφίδες με 12,5-15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 20-25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-60 λίτρα/ στρέμμα.

Αγγούρι θερμοκηπίου: Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα/ στρέμμα.

Βαμβάκι: Για αφίδες με 20-25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 25-30 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα/ στρέμμα.

Καπνός: Για αφίδες και αλευρώδεις με 25-30 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/ στρέμμα.

Πατάτα: Για δορυφόρο με 12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αφίδες με 20 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα/ στρέμμα.

Μηδική: Για αφίδες με 7,5-10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα/ στρέμμα.

Καλλωπιστικά: Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις και δευτερεύουσα δράση κατά του θρίπα με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/ στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

- Εσπεριδοειδή: 1
- Φυτώρια Εσπεριδοειδών και όλες οι άλλες καλλέργειες: 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Η διάρκεια δράσης του Profil 20 SG είναι 14-21 ημέρες.
3. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

- Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο.
- Να αποφεύγετε τη χρήση του PROFIL 20 SG σε καλλέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικωτινοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδεχθεί αναποτελεσματικά.
- Να γίνεται εναλλαγή του PROFIL 20 SG με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικωτινοειδή.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των ωφέλιμων αρθροπόδων:

- Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του PROFIL 20 SG, η εξαπόλυση βομβινών (για επικονίαση των ανθέων) ή/και αρπακτικών ακάρεων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φύλλων.
- Η εξαπόλυση των μενόνιπτερων παρασιτοειδών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 βδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Η εξαπόλυση του αρπακτικού Ορίους θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 βδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Επιβάλλεται η διατήρηση αψέκαστης ζώνης δέντρων εσπεριδοειδών σε ποσοστό 5% για τη προστασία του ωφέλιμου εντόμου **Cales noaki**.



Το **Profil 20 SG** είναι εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικωτινοειδών. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις, και ορισμένα Λεπιδοπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri). Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
- Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μικρή ποσότητα νερού.
- Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλών καλλωπιστικών φυτών συνιστάται πριν τον ψεκασμό της καλλέργειας να γίνει δοκιμή σε μικρή έκταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πορτοκάλια, Μανταρινιά, Λεμόνια, Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Βερικόκα, Κεράσια, Δαμάσκηνα, Βαμβάκι, Καπνός, Μηδική: **14 ημέρες**
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες: **7 ημέρες (υπαίθρου), 3 ημέρες (θερμοκηπίου)**

Μαρούλια (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Πατάτες, Πεπόνι αγρού: **7 ημέρες**

Αγγούρι θερμοκηπίου: **3 ημέρες**

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε στο άνω μέρος του κουτιού
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



acetamiprid (ασεταμπριντ)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση:
Acetamiprid 20% β/β
Βοηθητικές ουσίες 79,85% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων



ΒΛΑΒΕΡΟ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επεγγελματίες χρήστες

Αρ. Εγκ. Κυκλοφορίας Υπ. Γεωργίας: 14139/22-6-2006

Καθαρό βάρος: 300 γρ.

Κάτοχος της έγκρισης:
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH
Berliner Allee 42, 402012 Düsseldorf, Γερμανία
Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας:



ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ 2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • Εάν καταποθεί ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία. • Να μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για τους οπωρώνες. • Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μ. από μη-καλλιεργήσιμες εκτάσεις για οπωρώνες εσπεριδοειδών.

«Σε περίπτωση εισόδου των εργαζομένων σε ψεκασμένους αγρούς, αυτοί θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας να ξεπλυθείτε καλά, με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι με νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

