

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ζεστό. **Σε περίπτωση κατάποσης,** να μην προκληθεί εμετός. Χορηγήστε νερό ή γάλα. Μην δίνετε τίποτα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλεφάρια ανοικτά. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες ή δοχεία) ξεπλένονται υπο πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική και απαραβίαστη καλή κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας, ηλιακό φως και σημεία ανάφλεξης, προστατευμένο από πάγο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.



02/2008-9



Gibberellins (Γιββερελλίνη) 1,9%
N6-benzyladenine (N6-βενζιλιαδενίνη) 1,9%
Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση: **Gibberellins A4+A7 1,9% β/ο**
N6-benzyladenine 1,9% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 96,03% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλφο.: 8187/03.09.2008

Φυτορρυθμιστική ουσία ανάπτυξης μηλιάς

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Κάτοχος της έγκρισης:

Valent Biosciences - Γαλλία

Παρασκευαστής:

Valent Biosciences Corporation - Η.Π.Α.

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

A to Z Drying - Η.Π.Α.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Promalin®

1,9/1,9 SL

ΠΡΟΜΑΛΙΝ:

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αύξηση του μεγέθους και τη βελτίωση του σχήματος των μηλών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος χωρίς απορροή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την ποσότητα που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα του νερού που χρειάζεται συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα νερό)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Αύξηση του μεγέθους και βελτίωση του σχήματος των μηλών. Δόση: 35-50 κ.εκ. + 40-100 κ.εκ. μη ιονικού διαβρέκτη⁽²⁾ με 100 λίτρα νερό/στρέμμα. Συνιστώνται 2 ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών περίπου. Η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της άνθησης (30-40% των ανθέων ανοικτά) και η δεύτερη κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων.

Μείνιτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2 / 7-14.

Παρατηρήσεις:

1) Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται με τη δροσιά, τις απογευματινές ώρες. 2) Η χρήση κατάλληλου μη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα στο μείγμα βυτίου με το Promalin® θα βελτιώσει την κάλυψη των ανθέων και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Εφαρμογή υπό μορφή ποτίυ ήπεντων σταγονιδίων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή κάλυψη χωρίς απορροή. 3) Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 32°C. 4) Μην το χρησιμοποιείτε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει μέσα σε 6 ώρες από την εφαρμογή. 5) Η εφαρμογή να γίνεται όταν τα δένδρα είναι στεγνά. 6) Να χρησιμοποιείται καθαρό νερό για την διάλυση του φαρμάκου και το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται μέσα σε 24 ώρες από την προετοιμασία του. 7) Το pH του ψεκαστικού υγρού να μην υπερβαίνει το 8. 8) Να χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες θρέψης της καλλιέργειας είναι κανονικές.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΕΣ:

Δεν αναμένεται να υπάρξουν, κατά την εφαρμογή του Promalin®, δυσμενείς επιδράσεις από τη μεταφορά με τον άνεμο σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες. Πάντως θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και κυρίως να αποφεύγεται ο ψεκασμός όταν φυσά άνεμος ώστε να μη συμβαίνει μεταφορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες.

