

PYRIFOS 48 EC

chlorpyrifos (χλωροπυριφός) 48%
(ομάδα οργανοφωσφορικών)

Γαλακτωματοποίηση σκεύασμα (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

chlorpyrifos 48% β/β

βοηθητικές ουσίες 54,01% β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο
επαφής, στομάχου και αναπνοής



ΤΟΞΙΚΟ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του κοντά σε επίγεια θεραπεία ύδατα.

Αριθμ. Έγκρις. Κυκλοφορίας: 1772/ 17-12-1998

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Παρασκευαστής - Κάτοχος έγκρισης: VECTOR AGRO S.A.
Εργοστάσιο παρασκευής/ συσκευασίας - Διανομέας:

ΚΩ.Ευθυμιάδα αβεε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•ΤΗΛ.2310 568656 •FAX:2310 798423 •e-mail: info@efthymiads.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά) για Ανάρσινα, Βαμβακάδα, Καρπόκαφα, Φυλλοδέτες, Ζευζέρα, Κόσσοσ, Ξυλοφάγα έντομα με 100-125 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Κρέπιδ-Φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά) για Ψευδοκόκκο, Κόκκινη ψώρα, Λεκάριο, Ασπιδιωτό, Ισέρια, Μυτιλομορφή ψώρα, Λοιπές ψώσεις, Ανθοτρίτη, Αφίδες, Θρίπες με 100-125 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό. Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασμών μετά από 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούλιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) για Καρπόκαφα, Ανθόνιο, Υπονομευτή, Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα, Ματόψειρα, Φυλλορύκτες, Ζευζέρα, Κόσσο, Ξυλοφάγα έντομα με 100-125 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Ραπάνια, Κρεμμύδια, Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες, Αγκινάρες) για Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο ακουλήκι, Περίδα με 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη όπου χρειάζεται μετά από 15 ημέρες.

ΒΑΜΒΑΚΙ για Πράσινο ακουλήκι, Ροδίνο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Θρίπες με 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων σε 15 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΕΣ για Αφίδες, Φθορμαία, Δορυφόρο με 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη όπου χρειάζεται μετά από 15 ημέρες.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα):

• Πυρηνόκαρπα: 150-250, • Εσπεριδοειδή: 200-400, • Μηλοειδή: 100-200, • Λαχανικά, Βαμβάκι, Πατάτα: 50-80.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερηγτική περίοδο: 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ:

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρπούζι, Αγγούρι, Καλοκήλι), **ΠΑΤΑΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΙΤΑΡΙ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ:**

-για Σιδεροσκούληκα, Υλέμια. Δόση: 520 κ.εκ./ στρ. (καθοδική εφαρμογή) ή 200 κ.εκ./ στρ. (εφαρμογή σε λιωρίδες ή αυλάκια),

-για Πρασάγγουρα, Χιώραπα, Ζάμπρο. Δόση: 200 κ.εκ./ στρ. (καθοδική εφαρμογή) ή 100 κ.εκ./ στρ. (εφαρμογή σε λιωρίδες ή αυλάκια),

-για Κοφτοσκούληκα. Δόση: 130 κ.εκ./ στρ. (καθοδική εφαρμογή) ή 80 κ.εκ./ στρ. (εφαρμογή σε λιωρίδες ή αυλάκια).

Χρόνος εφαρμογής: Μία εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ. (με 50 λίτρα ψεκ.υγρού/στρέμμα).

ΣΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΑ: για Σιδεροσκούληκα, Υλέμια, Πρασάγγουρα, Χιώραπα, Ζάμπρο, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 5 κ.εκ./ 10 τ.μ. Χρόνος εφαρμογής: Μία εφαρμογή μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος.

ΚΑΠΝΟΣ, ΤΟΜΑΤΑ: για Σιδεροσκούληκα, Υλέμια, Πρασάγγουρα, Χιώραπα, Ζάμπρο, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 150 κ.εκ./ στρ. Χρόνος εφαρμογής: Μία εφαρμογή κατά το φύτεμα με το νερό του φυτέματος.

ΠΑΤΑΤΑ: για Σιδεροσκούληκα, Υλέμια, Πρασάγγουρα, Χιώραπα, Ζάμπρο, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 200 κ.εκ./ στρ. Χρόνος εφαρμογής: Μία εφαρμογή κατά το φύτεμα. Ψεκασμός του εδάφους στις αυλακίες.

ΔΟΛΩΜΑΤΑ:

για Κοφτοσκούληκα (Agratis spp.), Πρασάγγουρα (Gryllotalpa spp.). Δόση: 100 κ.εκ./ στρ. με 3 κιλά λίπασμα σε ένα λίτρο νερό και διασκορπισμός στη συνέχεια.

Τρόπος εφαρμογής:

- Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρις απορροής
- Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση
- Δολώματα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο ανάδευοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου και των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον για 21 ημέρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή: 30 ημέρες

Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Μην ανανέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δεξίτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε τη βοήθεια ιατρού ο οποίος θα αποφασίσει το αν θα προκληθεί εμετός ή όχι. Αναπνοή: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως τη δερματική περιοχή στην οποία έπεσε σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Θεωική ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

Το υλικό και ο περιεκτικός του να θεωρηθούν
κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε τη ελεύθερωση του στο
περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες
/δεητίο δεδομένων ασφαλείας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μη ψεκάσετε τα ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε
τα ανθισμένα ζιζάνια.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό
πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγούμενος με τρίπλημα, για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκεύασματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, μακριά από
το άμεσο ηλιακό φως, τις ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από τρόφιμα,
ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά και λιπάσματα. Στις συνθήκες
αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη



M:60 Y:50

M:100 Y:100

305X130