

PYRIFOS 5 GR

chlorpyrifos -χλωρπυριφός-
(ομάδα οργανοφωσφορικών)

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση: chlorpyrifos 5% β/β
βοηθητικές ουσίες 94,85% β/β

**Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής,
στομάχου και αναπνοής για την
καταπολέμηση εντόμων εδάφους**

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

• **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν
άμεση γειτνίαση με επίγεια (ρίμνες, ποτάμια) ή
υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά**

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1827/ 21-9-1999

Καθαρό βάρος: 10 κιλά

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-
Παρασκευαστής: CHEMINOVA BULGARIA, Βουλγαρία
Τυποποιητής-Συσκευαστής: INDALVA, Ισπανία
Διανομέας:



Κ.Α. Ευθυμιάδης αδελφοί

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην εισπνέετε την υπάρχουσα σκόνη πάνω από τα κουτιά της μηχανής (σπαρτική κλπ) όταν αδειάζετε το σκεύασμα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αίσθησης δυσφορίας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση ατυχήματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα. Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγήστε ότι το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι, αποφεύγοντας το τρίψιμο.

Για το γιατρό: Το προϊόν περιέχει chlorpyrifos, έναν παρεμποδιστή χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία).

Αντίδοτο: Χορηγείστε ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων, μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί. Οξίμες, όπως το obidoxime chloride (Τοξογονίνη) ή pralidoxime chloride (2-PAM), μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε τη ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δεητίο δεδομένων ασφαλείας.

Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / αποφύγετε μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους).

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απараβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, εφαρμοζόμενο κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Λαχανικά (παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πεπόνι, καρπούζι, μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, φασόλι, μπιζέλι, σπαράγγι, σέλινο, αγκινάρα, πράσο) ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Πρασσάγγουρα, Ζάβρο, Μηλοθρόνθη, Χλώροπα, Μυριάποδα **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια ή **1 κιλό ανά στρέμμα**, με εφαρμογή κατά την σπορά ή φύτευση σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος. Για τα Σιδηροσκούληκα και την Υλέμυια **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 5-6 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σ' όλη την επιφάνεια.

ΒΑΜΒΑΚΙ ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Πρασσάγγουρα, Ζάβρο, Μηλοθρόνθη, Χλώροπα, Μυριάποδα **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια ή **1,5 κιλό ανά στρέμμα** με εφαρμογή κατά τη σπορά σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος. Για τα Σιδηροσκούληκα και την Υλέμυια **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 5-6 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια.

ΠΑΤΑΤΑ ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Πρασσάγγουρα, Ζάβρο, Μηλοθρόνθη, Χλώροπα, Μυριάποδα, Σιδηροσκούληκα, Υλέμυια **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια ή **2 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή κατά τη σπορά ή **2,5-3 κιλά ανά στρέμμα** αν εφαρμοστεί κατά το παράχωμα.

ΣΙΤΗΡΑ ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Ζάβρο **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια και για Σιδηροσκούληκα με **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 5-6 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σ' όλη την επιφάνεια.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Πρασσάγγουρα, Ζάβρο, Μηλοθρόνθη, Χλώροπα, Μυριάποδα, **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν την σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια ή **1,2 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος και για Σιδηροσκούληκα και Υλέμυια **5-6 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν τη σπορά ή το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια.

ΚΑΠΝΟΣ ελέγχει τα έντομα εδάφους: Αγρότιδα, Πρασσάγγουρα, Ζάβρο, Μηλοθρόνθη, Χλώροπα, Μυριάποδα, **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-2,5 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια ή **1,5 κιλό ανά στρέμμα** με εφαρμογή κατά το φύτεμα σε γραμμές, αυθακίες ή λάκκους φυτέματος και για Σιδηροσκούληκα και Υλέμυια **5-6 κιλά ανά στρέμμα** με εφαρμογή πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στο καρπούζι εφαρμόζεται και με δοσολογία 1 γρ/ λάκκο φύτευσης.
- Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στην σπαρτική μηχανή ή με το χέρι.
- Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβλήθει προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα ή με λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος διασκορπισμός με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στη σπαρτική ή φυτευτική μηχανή, ή με το χέρι, και ενσωμάτωση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Δεν ορίζεται για προφυτρωτική εφαρμογή.

Πατάτα: 60 μέρες (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράχωμα).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 21 μέρες μακριά από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή. Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.

Ημερομηνία παρασκευής:

Αριθμός παρτίδας:

