

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. •Φοράτε κατάλληλα γάντια. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. •Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβήκη για ν' αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε αμέσως εμετό (εφόσον ο παθώντας έχει τις αισθήσεις του). Μην χορηγείτε τίποτα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε επείγοντως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση εισπνοής** βγάλτε τον παθώντα στον καθαρό αέρα. Αν χρειασθεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Αντιδοτό:** Θειϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποστειλθούν όλη σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική κατάσταση συσκευασίας, σε χώρο ξηρό και δροσερό, μακριά από πηγές θερμότητας ή ανάφλεξης και σε θερμοκρασία άνω των 0°C. Σε περίπτωση συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Pyrinex®

25CS

Chlorpyrifos (Χλωρπυριφώς) 25%

Αιώρημα μικροκαψουλών

Εγγυημένη σύνθεση: **Chlorpyrifos 25% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 76,57% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. οφ.: 1903/26.7.01

Ημ/νία λήξης: 1.7.2010

**Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής,
στομάχου και αναπνοής**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**Απαγορεύεται η εφαρμογή του κοντά σε επίγεια
χερσαία ύδατα και με αεροψεκασμούς. Προορίζεται
μόνο για επαγγελματίες.**

**ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ**



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Παρασκευαστής του σκευάσματος:

Makhteshim Chemical Works - Ισραήλ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για
την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΥΡΙΝΕΞ 25: Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέυση.

ΚΑΛΗΠΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

α) Ψεκάσμος φυλλώματος: Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση των εντόμων και δεύτερος (εφόσον απαιτηθεί) στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ-φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά): Ψευδόκοκκος, Κάκκινη ψάρα, Λεκάνιο, Ασπιδιώτης, Ισάρινα, Μυτιλόμορφη ψάρα, Λοιπές ψάρες, Αφίδες, Θρίπες, Ανθοτρήτης. Δόση: **200-240 κ.εκ./100 λίτρα νερό** (με 200-400 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). Για τα κοκκοειδή γίνονται 1-2 ψεκάσμοι από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά):** Καρπόκαφα, Ανθράκινος, Υπονομευτής, Ξαν Ζοζέ, Βαμβάκοδα, Ματόψαιρα, Φυλλορρυκτές, Ζευζέρα, Κόσος, Ψυλλοφάγα έντομα. Δόση: **200-240 κ.εκ./100 λίτρα νερό** (με 100-200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινια-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά):** Ανάρα, Βαμβάκοδα, Καρπόκαφα, Φυλλοσδέτες, Ζευζέρα, Κόσος, Ψυλλοφάγα έντομα. Δόση: **200-240 κ.εκ./100 λίτρα νερό** (με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). **ΑΜΠΕΛΙ:** Ευδεμίδα, Ψευδόκοκκος, Τζιτζικόκι. Δόση: **200 κ.εκ./100 λίτρα νερό** (με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). Μία (1) εφαρμογή για τον έλεγχο της δεύτερης γενιάς της ευδεμίδας με ταυτόχρονη καταπολέμηση για τον ψευδόκοκκο και το τζιτζικόκι. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο-Ραπάνια-Κρεμμύδια-Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγινάρες):** Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο ακουλήκι, Πιριδα. Δόση: **400-480 κ.εκ./στρ.** (με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Σπαντόπτερο, Αφίδες, Θρίπες. Δόση: **400-480 κ.εκ./στρ.** (με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα). **ΠΑΤΑΤΑ:** Δασυφόρος, Φθορμιαία, Αφίδες. Δόση: **400-480 κ.εκ./στρ.** (με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα: 1-2 εφαρμογές, Λαχανικά-Πατάτα: 1-2 (στα κρεμμύδια 2 εφαρμογές), Βαμβάκι: 2 εφαρμογές, Αμπέλι: 1 εφαρμογή.

β) Εφαρμογή στο έδαφος: Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους πριν τη σπορά ή φύτεμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΑΤΑΤΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΚΑΠΝΟΣ: Σιδηροσκουλήγκα, Υγέμια. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** (καθοδική εφαρμογή) ή **380 κ.εκ./στρ.** (σε λιωρίδες ή αυλάκι). Πρασόγγουρας, Χλωρόπας, Ζάμπουρας. Δόση: **380 κ.εκ./στρ.** (καθοδική εφαρμογή) ή **190 κ.εκ./στρ.** (σε λιωρίδες ή αυλάκι). Κοφτοσκουλήγκα. Δόση: **250 κ.εκ./στρ.** (καθοδική εφαρμογή) ή **150 κ.εκ./στρ.** (σε λιωρίδες ή αυλάκι).

ΣΠΟΡΕΙΑ-ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΑ: Δόση: **10 κ.εκ./10 τ.μ.** Μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος. **ΚΑΠΝΟΣ-ΤΟΜΑΤΑ:** Δόση: **290 κ.εκ./στρ.** Κατά το φύτεμα. Εφαρμογή με το νερό του φύτεματος. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δόση: **380 κ.εκ./στρ.** Κατά το φύτεμα. Ψεκάσμος του εδάφους στις αυλάκες. **ΔΟΛΩΜΑΤΑ:** Κοφτοσκουλήγκα, Πρασόγγουρας. Δόση: **190 κ.εκ./στρ.** με 3 κιλά λίπασμα σε 1 λίτρο νερό και διασκορπισμό στη συνέχεια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι-Εσπεριδοειδή-Μηλοειδή: **30 μέρες**, Λοιπές καλλιεργήσιες: **20 μέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργήσιες και δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στις πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Μέλος του

