

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση αδιαθεσίας λόγω εισπνοής ατμών ή σταγονιδίων, μεταφέρατε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αν είναι ανάγκη χορηγήστε οξυγόνο. **Αντίδοτο:** Είναι παρεμποδιστής χολινεστεράσης. Χορηγήστε 2 mg ατροπίνη ανά 15-20 λεπτά αν είναι απαραίτητο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ Τ'ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



04/2009-3



Pyrinex®

48EC

Chlorpyrifos (Χλωρπυριφός) 48%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Chlorpyrifos 48% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 53,76% β/β

Διαλυτής: Ξυλόλη

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 1508/7.8.86

Ημ/νία Λήξης: 30.06.2010

**Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο
επαφής, στομάχου και ατμών**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ**

**ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και διανομή-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊθάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/ωκ.: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΥΡΙΝΕΞ 48%:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών για την καταπολέμηση μυητικών και μασπτικών εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με καλό θούισμο των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος σε μια μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές τα κενά συσκευασίας ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά): Κόκκινη ψώρα, Ψευδόκοκκος, Λεκάνιο, Ασπιδιώτης, Ισέρις, Μυτιλήμορφη ψώρα, Λοιπές ψώρες, Θρίπες, Αφίδες, Ανθοτρίτης. Δόση: **100-125 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 μέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί γίνονται από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο πριν εγκατασταθούν στον καρπό. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά):** Καρπόκαψα, Αφίδες, Ανθόνυμος, Υπονομευτής, Σαν Ζοζέ, Βαμβάκας, Ματόψωρα, Φυλλορύκτες, Φυλλοδότες, Ζευζέρα, Κόσσοι, Ξυλοφάγα έντομα. Δόση: **100-125 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη εφαρμογής μετά από 15 ημέρες. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Δαμασκινιά-Νεκταρινιά):** Αφίδες, Βαμβάκας, Καρπόκαψα, Ανάρσια, Ζευζέρα, Κόσσοι, Φυλλοδότες, Ξυλοφάγα έντομα. Δόση: **100-125 κ.εκ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. Επανάληψη εφαρμογής μετά από 15 ημέρες. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο-Ραπάνια-Κρεμμύδι-Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγκινάρες):** Αφίδες, Θρίπες, Πρόσινο ακουλήκι, Περίδα. Δόση: **200-250 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανά 15 ημέρες. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πρόσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι, Σποντοπτερά, Αφίδες, Θρίπες. Δόση: **200-250 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων ή ανά 15 ημέρες. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος, Φθοριμαία, Αφίδες. Δόση: **200-250 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Επανάληψη ανά 15 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Εσπεριδοειδή (200-400), Μηλοειδή (100-200), Πυρηνοκαρπία (150-250), Λαχανικά-Βαμβάκι-Πατάτα (50-80).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Δύο (2) εφαρμογές.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή-Μηλοειδή: **30 ημέρες**, Λοιπές καλλιεργείες: **20 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαράβατη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Μέλος του

