ΠΥΡΙΝΕΞ ΚΟΚΚΩΔΕΣ:
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, εφαρμοζόμενο πριν ή κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ομοιόμορφος διασκορπισμός με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στη σπαρτική ή φυτευτική μηχανή και ενσωμάτωση. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι-Καρότο-Κρεμμύδι-Τομάτα-Πεπόνι-Καρπούζι[1]-Κουνουπίδι-Λάχανο-Μαρούλι-Φασόλι-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κολοκυθάκι-Σέλινο-Σπαράγγι-Αγκινάρα-Πράσο-Μπρόκολο-Μπιζέλι): Έντομα εδάφους: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **1 κιλό /στρ.** κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Σιδηροσκούλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. Δόση: **5-6 κιλά/ στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. ***ΒΑΜΒΑΚΙ***: Έντομα εδάφους: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **1,5 κιλά/στρ.** κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Σιδηροσκούλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. Δόση: **5-6 κιλά/ στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. ***ΠΑΤΑΤΑ***: Έντομα εδάφους: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα, Σιδηροσκούλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **2 κιλά/στρ.** κατά τη σπορά, ή γ) Δόση: **2,5-3 κιλά/στρ.** κατά το παράχωμα. ***ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι-Σίκαλη-Κριθάρι-Βρώμη)***: Αγρότιδα ή Καραφατμέ, Ζάβρος. Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. Σιδηροσκούήλικα. Δόση: **5-6 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. ***ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ***: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **1,2 κιλά/στρ.** κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Σιδηροσκούήλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. Δόση: **5-6 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. ***ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ***: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **1,2 κιλά/στρ.** κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Σιδηροσκούήλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. Δόση: **5-6 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας. ***ΚΑΠΝΟΣ***: Έντομα εδάφους: Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Πρασάγγουρας ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόπτης, Ζάβρος, Μηλολόνθη ή Ασπροσκούήλικο, Χλωρόπας, Μυριάποδα. α) Δόση: **2-2,5 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας, ή β) Δόση: **1,5 κιλά/στρ.** κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Σιδηροσκούήλικας, Υλέμυια ή Πιτάκι ή Πηδούλι. Δόση: **5-6 κιλά/στρ.** πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ'όλης της επιφάνειας.

Παρατηρήσεις:
1. Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι. 2. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού. 3. Στο **καρπούζι** εφαρμόζεται και με δοσολογία **1** γρ. / λάκκο φύτευσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πατάτα: **60 ημέρες** (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράχωμα).
Λοιπές καλλιέργειες: **Μ.Ε.** (προφυτρωτική εφαρμογή).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δε συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα ή με λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά σακκίδια και οι κενές σακκούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Pyrinex® 5 GR

Chlorpyrifos (Χλωρπυριφώς) 5% Κοκκώδες

Εγγυημένη σύνθεση: **Chlorpyrifos** 5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 94,84% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 1592/29.06.1992
Ημερ.Λήξης Έγκρισης: 30.06.2010

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια), ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά.

ΑΛΦΑ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα. Πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε. •Φοράτε κατάλληλα γάντια. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης ή ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέττα. ***Αντίδοτο:*** θειϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ / ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ)
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ **21** ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΒΟΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 200 γρ.

04/2010-6