

Προφυλάξεις

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Το υλικό και οι περιέκτες του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνα απόβλητα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αρκετές φορές με νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί έμετος. Να μη δοθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Οδηγίες για τον γαστρά: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική Σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε συνθήκη θερμοκρασίας (σε ήπιο κλίμα). Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



PASSWORD 25 EW

Μυκητοκτόνο

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Tebuconazole (τεμπουκοναζόλ) 25 %

Εγγυημένη Σύνθεση : tebuconazole 25 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 72,93 % β/β

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 60.111 / 10.04.07

Δισυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14.

- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της Έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: AGRODAN SA, ALMANSA 105, E-28040, MADRID, SPAIN
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Γαλένος | Αρτίδας 93, 171 24 - Ν. Σμόρνη, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 56 12 025 | e-mail: g_galenos@yahoo.gr

Αποκλειστικός Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com

www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 1 λίτρο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι: Ωίδιο (*Uncinula necator*) 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό, 32-40 κ. εκ./στρέμμα. Εφαρμογές από το στάδιο της καρπώσεως μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής.

Σπαράγγι: Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*) 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό, 100 κ. εκ./στρέμμα. Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Ογκος ψεκαστικού υγρού:

Αμπέλι: 80-100 λίτρα/στρέμ.

Σπαράγγι: 100 λίτρα/στρέμ.

Μεγ. αριθμ. εφαρμ. ανά καλλ. περ. / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Αμπέλι: 2/12-14

Σπαράγγι: 3/14

Παρατηρήσεις:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Χρήση του PASSWORD 25 EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: -

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 21 ημέρες

Σπαράγγι: 6 μήνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

