

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να αναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλαιμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκέυασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φυσουκούν τα μάτια καθώς και στα κολοκυνθώδη. Οι ποικιλίες της μηλιάς Golden Delicious, Jonathan, Renetta και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκέυασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Επίσης παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφευχθεί η χρήση του κατά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθετώνται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Εσπεριδοειδή: 3, Αμυγδαλιά: 3, Φουντουκιά: 3, Καρυδιά: 4, Φιστικιά: 4, Μηλοειδή: 3, Πυρηνόκαρπα: 2, Αμύγδα: 2, Ελιά: 2, Λαχανικά: 2, Τομάτα: 1, Πατάτα: 2, Ζαχαρότευλα: 2, Καλλωπιστικά: 2.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή, Αμύγδα, Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευλα: 21 ημέρες. Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά: 28 ημέρες. Τομάτα υπαίθρου: 10 ημέρες. Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες. Λαχανικά (υπαίθρου, θερμοκηπίου): 7 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος/See above

Ημ. Παρασκευής: Βλέπε άνω μέρος/See above

Ημ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος/See above



Pasta Caffaro® 38,25 SC

Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 38.25% β/ο
(σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
(χημική ομάδα: ανόργανα άλατα χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 55.26% β/β



061203B

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

**ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6763/26-3-1999

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **1** λίτρο



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΠΕΥΘΕΥΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
ISAGRO S.p.A., Μιλάνο, Ιταλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ISAGRO S.p.A., Ιταλία
ΠΕΥΘΕΥΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ISAGRO HELLAS Μ.ΕΠΕ., Πλίνθου 39, 183 44 Μοσχάτο, Αθήνα.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
Τηλ.: 210-6860130. www.basf-agro.gr

© Σήμα κατατεθέν ISAGRO

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Μανταρινιά, Κιτριά, Νεραντζιά): *Καυτοφθώρα*, *Σεπταρίωση* 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. *Επανάθωρα καρπών* 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και ακολουθώντας μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1.5 μ. από το έδαφος. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 125-250 λίτρα/στρέμμα. **Αμυγδαλιά:** *Κηλίωση φυλλών* 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φυσουκούν τα μάτια. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Φουντουκιά:** *Βακτηριακός έλκος* 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές: α) μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φυλλών. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Καρυδιά:** *Ανθράκωση, Κηλίωση φυλλών* 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Φιστικιά:** *Σεπταρίωση* 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές: α) στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β) όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ. γ) μετά από 20 ημέρες. δ) αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά):** *Φουζικλάδιο, Σεπταρίωση, Φαά σήψη* 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φυλλών και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφάρσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. *Βακτηρίωση, Βακτηριακός κάμψιμο* 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φυλλών. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-200 λίτρα/στρέμμα. **Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά):** *Εκώσκακος, Καρύγεο, Κλαδοσπορίωση* 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμόζονται α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν την δόκιμωση των οφθαλμών. *Φαά σήψη* 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές στη δόκιμωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. *Βακτηριακός έλκος* 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Σε περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμόζονται στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φυλλών. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 100-120 λίτρα/στρέμμα. **Αμύγδα (για επιτραπέζια και οινολογία σταφύλια):** *Περωνόσπορος, Ανθράκωση* 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Ελιά:** *Κυκλοκόνια* 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Δύο εφαρμογές. Η πρώτη το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. *Κλασπορίω* 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Δύο εφαρμογές. Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. *Καρβύνια* 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάδι ή παγετό. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 150-300 λίτρα/στρέμμα. **Λαχανικά (Καρότο, Ραπανάκι, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πρόσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραβδί, Αγινάρα, Ξέλινο, Φασόλι, Μπέντζι):** *Περωνόσπορος* 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. *Κλαδοσπορίωση, Σεπταρίωση, Ανθράκωση* 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου):** *Περωνόσπορος* 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Προληπτικές εφαρμογές εφάρσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. *Βακτηριακή κηλίωση* 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και εφάρσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Πατάτα:** *Περωνόσπορος* 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Ζαχαρότευλα:** *Κεκοσπορίωση* 450 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 40 λίτρα/στρέμμα. **Καλλωπιστικά:** *Περωνόσπορος, Φυτοφθώρα* 370-450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. *Όγκος ψεκαστικού υγρού:* 50-100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. • Στα λαχανικά να αποφευχθούν οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. • Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφάρσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. • Στις καλλιέργειες: αμύγδα, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.