

Perfekthion® 40 EC

Dimethoate (ντιμεθοεΐτ)

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Dimethoate 40% β/ο

(ομάδα: οργανοεισφοσφορικοί εστέρες)

Βοηθητικές ουσίες 61.5% β/β

**Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Εύφλεκτο.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 14404/15-10-2012

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο : 1 λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: BASF SE, Limburgerhof, Γερμανία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,

153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



4 014348 948272



Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε • Μην αναπνέετε το ψεαστικό νέφος • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας • Να φοράτε κατάλληλη μάσκα (FFP2) κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής • Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή • Η εφαρμογή σε οπωρώνες θα πρέπει να γίνεται μόνο με τρακτέρ εφοδιασμένο με κλειστή καμπίνα • Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεαστικό υγρό να έχει στεγνώσει • Να περιμένετε 5 και 21 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθουν σε οπωρώνες εσπεριδοειδών για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα • Να περιμένετε 2 και 14 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθουν στον ελαιώνα για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα • Να περιμένετε 5 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθουν στην καλλιέργεια με καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και συγκομιδή • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεασμό

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

- κατά την παρασκευή του ψεαστικού υγρού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και προστατευτικό προσώπου.
- κατά την εφαρμογή με ψεαστική ράμπα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και ανθεκτικά παπούτσια.
- κατά την εφαρμογή με νεφελοποιηστικό: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια και σε περίπτωση σχημάτων χωρίς καμπίνα, επιπρόσθετα κάλυμμα κεφαλής και προσώπου και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. Η επανείσοδος στον ψεασμένο χώρο να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεαστικό υγρό. Αποφύγετε την έκθεση του σώματος και φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια.
- κατά την εφαρμογή με ψεαστικό αυλό: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, πλατύγυρο καπέλο και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα του θύματος αμέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας πουν να κάνετε κάτι τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Πιείτε μη προκαλείτε εμετό ή δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που είναι ανείσθητο ή έχει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα.

Οδηγίες για το γιατρό: Το Dimethoate είναι αναστολέας της χολινεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα προκαλώντας αναπνευστική καταστολή.

Μεταχείριση της αναστολής χολινεστεράσης: απαιτείται διαδικασία απολύμανσης όπως πλύση όλου του σώματος, πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.

Αντίδοτο: αν υπάρχουν συμπτώματα, χορηγήστε atropine sulphate σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά στο συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5 - 10 λεπτά έως τα συμπτώματα ατροφισμού να εμφανισθούν και διατηρήστε τον πλήρη ατροφισμό έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό μεταβολισθεί. Συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθεί Obidoxime chloride (Toxogonin) ή εναλλακτικά pralidoxime-2-chloride (2-PAM). Όχι όμως σαν αντικαταστάτη του atropine sulphate. Η χορήγηση με σπύρα μπορεί να συνδυαστεί όσο χρειάζεται με πρώτα συμπτώματα πνευμονοπνευμονικής οδήμησης, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να μεταχειρισθεί συμπτωματικά. Για να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΟ ΞΕΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας

20 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας

5 μέτρων για τους οπωρώνες.

ΤΟ ΞΕΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε όλα τα είδη ανθοφόρων φυτών (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, ζιζανίων ή ανθοφόρων φυτών ως φυτοφράκτες). Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Οι τοπικοί μέλισσοκόμοι πρέπει να ενημερωθούν για τις επικείμενες εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι μέλισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή.

Για την εφαρμογή σε ελαιώνες θα πρέπει να τηρείται αφέκαστη ζώνη τουλάχιστον 5 μ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος Εφαρμογής: α) Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής, β) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου από εδάφους.

Α) Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ –φρουτ): Αφίδες (*Aphis spiraeicola* syn. *Aphis citricola*). Δόση: 100 – 120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο πρώτος ψεκασμός θα πρέπει να γίνει στο τέλος της άνθησης και ο δεύτερος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού (καρπός με έντονο πράσινο χρώμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Β) Ελιά: Δάκος (*Bractocera oleae*). α) Δολωματικοί ψεκασμοί[®] σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό. Δόση: 625 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού ανά δέντρο. Η εφαρμογή γίνεται σε 10 δέντρα/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 2 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. Μπορεί να συνδυαστεί με έναν ψεκασμό καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. β) Ψεκασμοί καλύψεως οι οποίοι αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή. Δόση: 80 – 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

Γ) Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια (εσαλότ): Θρίπες (*Thrips tabaci*). Δόση: 167 – 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 – 14 ημέρες.

Δ) Τομάτα και Μελιτζάνα Υπαίθρου: Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Aphis sp*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*). Δόση: 167 – 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

Ε) Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: Αφίδες (*Aphis gossypii*). Δόση: 167 – 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την άνθηση. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 – 14 ημέρες.

ΣΤ) Καρότο, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού: Μύγα του καρότου (*Psila rosae*). Δόση: 167 – 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανά 7 ημέρες.

Ζ) Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια: Αφίδες (*Aphis fabae*). Δόση: 50 – 60 κ.εκ./στρέμμα. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 21 ημέρες.

Η) Σιτηρά (Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Σκληρό Σιτάρι): Αφίδες (*Sitobion avenae*, *Rhopalosiphum padi*, *Metopolophium dirhodum*). Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Θ) Καλλωπιστικά Φυτά Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: Αφίδες (*Aphis fabae*, *Aphis gossypii*, *Aphis heradae*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum rosae*, *Macrosiphonella sanborni*). Δόση: 50 – 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε ψεκασμούς με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 100 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
- 2) Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες.
- 3) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας.
- 4) Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβολιά.
- 5) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμίων και των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολώματος 2 λίτρα/στρέμμα.
- 6) Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών.
- 7) Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίτωμα.
- 8) Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση.
- 9) Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις.
- 10) Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

- Είναι δυνατόν να εμφανιστούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες βαμβακιού και τομάτας.
- Να αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης στην τομάτα.
- Προκαλεί φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Λιανολιά Κερκύρας».
- Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς πλήρους καλύψεως φυλλώματος προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Κονσερβολιά»
- Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά: *Adiantum*, *Aralia Sieboldii*, *Asparagus plumosus*, *Begonia multiflora*, *Coleus hybridus*, *Calceolaria rugosa*, *Chrysanthemum indicum*, *Cissus antarctica*, *Ficus pandurata*, *Nephrolepis*, *Sanchezia*, *Sinningia speciosa*, *Gloxinia*, *Pteris (tremula, ensiformis, evergemensis)*, *Salvia splendens*
- Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS, στα χρυσάνθεμα και στην αλάδα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριώχρωση σε μερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πεύκο-κουκουναριά. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Να μην εφαρμόζεται σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νερού, πάγο ή ζημιά από ζιζανιοκτόνα).
- Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

- Ελιά: 28 ημέρες.
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γρεϊπ-φρουτ): 120 ημέρες.
- Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια (εσαλότ): 14 ημέρες.
- Τομάτα, Μελιτζάνα: 21 ημέρες.
- Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: Πριν την άνθηση.
- Καρότο, Παστινάκη, ρίζες Μαϊντανού: 35 ημέρες.
- Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια: 28 ημέρες.
- Σιτηρά: Τέλος άνθησης.
- Καλλωπιστικά: Δεν έχει εφαρμογή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

A) Για τους ψεκασμούς φυλλώματος: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. B) Για τους δολωματικούς ψεκασμούς: πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση θα πρέπει να είναι εντονότερη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- 1) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές μέθοδοι προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στον ελάχιστο απαιτούμενο για αποτελεσματικό έλεγχο
- 2) Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και χρόνο εφαρμογής και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος
- 3) Να ψεκάζετε μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο με βάση το κατώφλι επικινδυνότητας (εάν υπάρχει) και με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιμους οργανισμούς
- 4) Να κάνετε επισκόπηση της ευαισθησίας των πληθυσμών.

Να αποφεύγετε την επακόλουθη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν dimethoate και να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδες με διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι πυρεθρίνες και τα καρβαμικά σκευάσματα έχουν δείξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα οργανοφωσφορικά) όπως τα οργανοφωσφορικά.

Το σκεύασμα δεν πρέπει να αναμειγνύεται με Βορδιγάλειο Πολτό, αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ :

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.