



Πρεβικούρ Ένερτζ ΣΛ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Previcur ENERGY SL είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περυσόσπορου.

Το fosetyl-Al παρουσιάζει συμπλαστική και αποπ्लाστική κίνηση και δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επιφέροντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί στα οσπεία, εφαρμογές με πότνια, ψεκασμοί φυλλώματος, **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

ΣΠΟΡΕΙΑ: Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, **Μαρούλι:** Πύθιο (*Pythium* spp.) Εφαρμογές στο οσπείο. **Δόση:** 3 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 2 λίτρα νερό / τ.μ. **Πιπεριά:** Πύθιο (*Pythium* spp.) Εφαρμογές στο οσπείο. **Δόση:** 6 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 2 λίτρα νερό / τ.μ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Πεπόνι, Μαρούλι: Πύθιο (*Pythium* spp.) Ρίζοπτιση. **Δόση:** 300 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300 λίτρα νερό / στρέμμα.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου): Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Προληπτικοί ψεκασμοί ερσάνουν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. **Δόση:** 250 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος / στρέμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΣΠΟΡΕΙΑ: Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, **Μαρούλι:** 2 εφαρμογές: Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία εφαρμογή μετά τη βλάστηση των σπορίων (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες).

ΣΠΟΡΕΙΑ: Πιπεριά: 1 εφαρμογή. **ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Πεπόνι, Μαρούλι:

Καλλιέργεια στο έδαφος: 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες. Καλλιέργεια σε τεχνητά υποστρώματα: 4 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου): Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες ερσάνονται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εφαρμογές με ρίζοπτιση: Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μαρούλι: 3 ημέρες. Πεπόνι: 14 ημέρες, Μαρούλι (υπαίθρου): 21 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Λαχανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους Allium που προορίζονται για την διατροφή ανθρώπων και ζώων μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρούν στο ίδιο υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή. Κηπευτικά φυλλώδη, κηπευτικά με στέλεχος, καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανθή μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρούν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τριπλοπλυνθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257/01.07.2009

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: propamocarb 53% β/ο
fosetyl 31% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 25,2% β/β

**Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο
με προστατευτική δράση**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική του αφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, μακριά από το ηλιακό φως και σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατά).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης ανθρώπου από σπύχη: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, καλέστε γιατρό (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατά). Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα στόμα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. Να λαμβάνεται ενεργός ανθρακας. **ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ:** Συμπτώματα: Ακαμψία, υπηλία, δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική υπερευαισθησία. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων του σκευάσματος συστήνεται πλήρης στομάχι και χορήγηση ενεργού άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών οργάνων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

N 07 6912 09



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6196000, Fax: 210 6191000



5 200309 896624