

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε • Το υλικό και ο περιεκτής του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως επικίνδυνα απόβλητα • Αποφύγετε την ελεuthέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα εάν η έκθεση στο σκεύασμα είναι μεγάλη.

Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα, με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε δυο μεγάλα ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό βάζοντας το δάκτυλο βαθιά μέσα στο λαιμό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΡΘΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΣΜΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια αεικαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Στον αγρό που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, μπορούν να σπαστούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, μπιζέλια ή σόγια, μετά από βαθιά άροση. Να μην σπέρνονται α) Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλιάνθος ή καπνός πριν περάσουν 4 μήνες, β) Καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 μήνες, γ) Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκαμψή πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιεργίες και ποικιλίες, για τις συνιστάμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Για το ρύζι και τον ηλιάνθο, προσθέτουμε το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Για τη μηδική, διαλύουμε ξεχωριστά σε μικρή ποσότητα νερού την βέλτη αμμωνία και την προσθέτουμε στο ψεκαστικό βυτίο, αναδεύοντας συνεχώς. Η προσθήκη της βέλτης αμμωνίας στο ψεκαστικό διάλυμα είναι απαραίτητη για την καλύτερη διείσδυση του σκευάσματος στο φύλλωμα των ζιζανίων. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από τη ζέση, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες όχι πάνω από 20°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριτύμια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΙΜΗ: Μηδική: 28 ημέρες, Ρύζι, Ηλιάνθος: δεν εφαρμόζεται.



Imazamox (Ιμαζαμόξ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

Imazamox 4% β/ο (ομάδα ιμιδαζολινονών)
(4,22% άλας αμμωνίου)
Βοηθητικές ουσίες 96% β/β

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στη μηδική, το ρύζι και τον ηλιάνθο. Το imazamox αναστέλλει τη δράση της συνθάσης του ακετογαλακτικού (ALS).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦ.: 7680/3-1-2006.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210 6860130, www.basf-agro.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

® Σήμα κατατεθέν BASF



81066042 GR 1022

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΖΙΖΑΝΙΑ-ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κ.ε.κ. σκευάσματος ανά στρέμμα):

1) ΜΗΔΙΚΗ (*Medicago sativa*)

• Καταπολεμούνται ζιζάνια: Αγρονόματο (Solanum nigrum), Βλήθα (*Amaranthus retroflexus*), Α. βίλοειδης (*A. villosus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Τσούλας (*Datura stramonium*), Καφέλλα (*Capsella bursapastoris*).

Δόση: 125 + 400 γρ. βέλτης αμμωνίας.

Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα ανά στρέμμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Α) **Μία φύτευ:** Μία εφαρμογή μετά το φύτευμα ή μετά την πρώτη κοπή, όταν η καλλιέργεια έχει 2-5 φύλλα και τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ζωικής ανάπτυξης. Β) **Εγκατεστημένη φύτευ (από το δεύτερο χρόνο):** Μία εφαρμογή κατά το χειμερινό λήθαργο της μηδικής ή μετά την πρώτη κοπή (μόλις η μηδική αποκτήσει 2-5 νέα φύλλα), τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται σε στάδιο ζωικής ανάπτυξης.

2) **ΡΥΖΙ (*Oryza sativa*)** (Χρησιμοποιείται μόνο σε ποικιλίες Ρυζιού τύπου **Clearfield**, οι οποίες έχουν επιλεγεί για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο **imazamox**).

• **Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Πεντάνευρο νερού (*Alisma plantagoaquatica*), Μουχρίτσες (*Echinochloa spp.*), Ξετραντέρα (*Heteranthera filiformis*), Κόκκινο και Αγριο ρύζι (*Oryza spp.*), Ξετρίκος (*Scirpus spp.*), **Μείζια ευαίσθητα ζιζάνια:** Βούτυρο (*Butomus umbellatus*), Κύπερη (*Cyperus spp.*), Αμυγδοχώρη (*Digitalis sanguinalis*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Κεχρί (*Panicum dichotomiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris spp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα.

ΔΟΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Α) 2 διαδοχικές εφαρμογές στην προτεινόμενη δόση. Δόση: 2 εφαρμογές 87,5 + 100 DASH HC. Πρώτη εφαρμογή: Όταν το ρύζι είναι στο στάδιο των 3-4 φύλλων, αφού έχουν αδειάσει τα θάμνια. Το νερό επανέρχεται στα θάμνια 3-4 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεύτερη εφαρμογή: 21 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή αφού έχουν αδειάσει τα θάμνια. Το νερό επανέρχεται στα θάμνια 4 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μέγιστη ετήσια δόση Pulsar 4 SL είναι 175 κ.ε.κ./στρ. **Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

Β) Μία εφαρμογή μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται από το στάδιο των δυο φύλλων μέχρι την αρχή του αελαφιασμού (1-2 αδέλφια). Δόση: 125 + 100 DASH HC. **Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

3) **ΗΛΙΑΝΘΟΣ (*Helianthus annuus*)** (Χρησιμοποιείται μόνο σε ποικιλίες Ηλιανθού τύπου **Clearfield**, οι οποίες έχουν επιλεγεί για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο **imazamox**).

• **Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Βλήθα (*Amaranthus spp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Οροβάνχη (*Orobancha spp.*), Πολυκόμπος (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Ραουόκυλλος (*Flanulculus sardus*), Μορτάκος (*Senecio vulgaris*), Ξετρίκος (*Setaria spp.*), Σιτόφυκος (*Solanum nigrum*), Βέλουρας (*Sorghum halepense*), Ασπριγκάδο (*Xanthium spinosum*), Αγριομυλτιάνα (*Xanthium strumarium*), Μουχρίτσες (*Echinochloa crusgali*), Μείζια ευαίσθητα ζιζάνια: Βούτυρο (*Butomus umbellatus*), Κύπερη (*Cyperus spp.*), Αμυγδοχώρη (*Digitalis sanguinalis*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Κεχρί (*Panicum dichotomiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris spp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

Δόση: 100 + 50 κ.ε.κ. DASH HC.

Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-30 λίτρα ανά στρέμμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μία εφαρμογή στο διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των πρώτων 4 πραγματικών φύλλων και μέχρι την εμφάνιση των 6 πραγματικών φύλλων στο φυτό του ηλιανθού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το DASH HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του PULSAR 4 SL.

- Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμύδιω, οργανική ουσία < 2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαμηλές θερμοκρασίες και εντατικά αρδευόμενες καλλιέργειες.

- Στην καλλιέργεια του ρυζιού, στις 2 εφαρμογές των 87,5 κ.ε.κ. PULSAR/στρέμμα, το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των δυο εφαρμογών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 21 ημερών.