

L176877 GREC/11R



syngenta®

Azoxystrobin (αζοξυστρομπίν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ.

Γεωργ.: 6735/10-4-2002

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 76,2% β/β

Προστατευτικό

μυκητοκτόνο που

ελέγχει μύκητες

που ανήκουν

στους Ασκομύκητες,

Βασιδιομύκητες,

Δευτερομύκητες

και Ωομύκητες.



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

375 ml e

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E. , 153 49 Ανθούσα, Τηλ.: 210 6666612-13

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

www.syngenta.gr

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις για το υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε μέσα στο ψεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δεητίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπνεύσει σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε τον γιατρό προληπτικά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητείστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ. ΔΗΛΗΤΗΡ.: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελθασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Ελέγχει μύκητες που ανήκουν στους Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες και Ωομύκητες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που κινδυνεύουν από περονόσπορο και ωίδιο. Χρησιμοποιείτε λίγο νερό για τον ψεκασμό (μέχρι 120 λίτρα ανά στρέμμα και η ανάλογη ποσότητα νερού θα εξαρτάται από το μέγεθος της βλάστησης).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αμπέλι:

- Για το Ωίδιο (*Uncinula necator*) 50-75 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-120 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές κυρίως από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων.
- Για τον Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) 75-100 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-120 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών και εφόσον υπάρξει ένδειξη προσβολής περionoσπόρου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες.

Να γίνεται μία εφαρμογή με Quadris κάθε 3.

Παρατηρήσεις:

1. Όταν ο κίνδυνος προσβολής ωιδίου είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η μικρή δόση (50 κ.εκ. σκ./hl), με μεσοδιάστημα 12 ημέρες ενώ όταν είναι μεγάλος η ίδια δόση ανά δεκαήμερο. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεγάλη δόση (75 κ.εκ. σκ./hl).
2. Για το ωίδιο εφαρμογή του QUADRIS σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής (θείο, pyrazophos ή dinocap) ή διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης π.χ. DMI's.
3. Όταν ο κίνδυνος προσβολής περonosπόρου είναι μικρός έως μέτριος να εφαρμόζεται η μικρή δόση (75 κ.εκ. σκ./hl) με μεσοδιάστημα 12 ημερών. Στην περίπτωση υψηλού κινδύνου να χρησιμοποιείται μεσοδιάστημα 10 ημερών και σε ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες (επιδημία) να χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση (100 κ.εκ. σκ./hl).
4. Για τον περονόσπορο εφαρμογή του QUADRIS σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Περιορισμοί στην χρήση:

- Αποφυγή θεραπευτικών επεμβάσεων.
- Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπελιού.

Φυτοτοξικότητα:

Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες ένα ελαφρό, διάχυτο κιτρίνισμα των φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με QUADRIS. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα (π.χ. διαφυλλική λίπανση κλπ.).

- Το QUADRIS είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείται το QUADRIS για εφαρμογές στις μηλιές.
- Μην χρησιμοποιείτε για ψεκασμό μηλιάς, ψεκαστικά μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί με QUADRIS.
- Μην χρησιμοποιείτε το QUADRIS εάν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: 21 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων: Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή του αμπελώνα όπου χρησιμοποιήθηκε το QUADRIS ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τσιμεντένιο δάπεδο και συλλογή των εκπλυμάτων σε ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό. (Το QUADRIS είναι φυτοτοξικό στη μηλιά, να μην χρησιμοποιούνται για ψεκασμό μηλιάς ψεκαστικά μέσα που έχουν προηγουμένως εφαρμόσει το QUADRIS 25 SC, βλέπε φυτοτοξικότητα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί για τον καθαρισμό σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, δηλαδή, αδιάβροχο, γάντια που να αντέχουν σε χημικά, μπότες και κάλυμμα για τα μάτια. Το χυμένο QUADRIS θα πρέπει να απορροφηθεί σε άμμο, χώμα ή άλλο διαθέσιμο απορροφητικό υλικό.

Στη συνέχεια απομακρύνεται το απορροφητικό υλικό με το QUADRIS σε δοχεία και ξεπλένεται με νερό ο χώρος, λαμβάνοντας πρόνοια για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου στράγγισης ή άλλων επιφανειακών νερών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να γίνεται μία εφαρμογή με QUADRIS κάθε 3. Μετά τον ψεκασμό με QUADRIS να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα εναλλαγή του QUADRIS με τα μυκητοκτόνα που έχουν ως δρών συστατικό το *kresoxim methyl* ή *famoxadone*, δεν επιτρέπεται.



