

L177355 GREC/12R

 **QuadrisMax[®]**
9.35/50 SC

syngenta[®]

Azoxystrobin (αζοξυστρομπίν)
(ομάδα στρομπιλουρινών)
Folpet (φολπετ)
(ομάδα φθαλιμιδίων)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60253/28-4-09

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin: 9,35% (β/ο)

Folpet: 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 49,9 % β/β

**Μυκητοκτόνο κατά
του περονόσπορου,
του ωιδίου και της φώμοψης
στις οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπελιού με ψεκασμό
φυλλώματος.**



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

500 ml e

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως
- Υποπτο καρκινογένεσης
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μη πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλή αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρο και προστατεύστε τον από υποθερμία.

Σε περίπτωση επαφής με τα δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν φοράτε. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

- *Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.*
- *Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνεται αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.*

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες ένα ελαφρό, διάχυτο κιτρίνισμα των φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείτε και φυσιολογικά είναι καμιά φορά πιο έντονο μετά τον ψεκασμό με Quadris Max 9.35/50SC. Κρατάει λίγες μέρες(περίπου μια βδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα (π.χ διαφυλλική λίπανση κτλ).

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλή αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία -10 °C έως 35 °C.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		ml/ στρ. (max)	ml/ 100 ήτ. ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού ήτ./ στρ.		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	200	150-200	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες	Μέχρι 3 εφαρμογές
	Ωίδιο (Uncinula necator)					
	Φώμοψη (Phomopsis viticola)					

Παρατηρήσεις:

- Όταν ο κίνδυνος προσβολής περονόσπορου είναι μικρός έως μέτριος να εφαρμόζεται η μικρή δόση των 150 κ.εκ. σκευ./hl με μεσοδιάστημα 12 ημερών. Στην περίπτωση υψηλού κινδύνου να χρησιμοποιείτε μεσοδιάστημα 10 ημερών και σε ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ασθένια συνθήκες (επιδημία) να χρησιμοποιείτε η δόση των 200 κ.εκ. σκευ. /hl.
- Η αποτελεσματικότητα του QUARDIS MAX δεν επηρεάζεται απο τη βροχόπτωση 3 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- Μην εφαρμόζετε το Quardis Max 9.35/50 SC σε φυτώρια αμπελίου.
- Να μην χρησιμοποιείτε το QUARDIS MAX σε αμπελώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργεια μηλιάς εφόσον υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος στους οπωρώνες μηλιάς.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που κινδυνεύουν από περονόσπορο, ωίδιο και φώμοψη. Για τον ψεκασμό χρησιμοποιείτε 50-100 λίτρα νερού ανα στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος της βλάστησης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι την μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπο συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύντε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπιμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Αμπέλι: 42 ημέρες.

Τρόπος δράσης:

Το azoxystrobin (ομάδα στρομπιλουρινών) είναι μυκητοκτόνο προστατευτικό με μερική διεγασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκήλιου και την παραγωγή των σπορίων ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας. Το folpet (ομάδα φθαλιμιδίων) είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων και πολλαπλή δράση στο υποκυτταρικό επίπεδο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το Quadris Max 9.35/50 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το Quadris Max 9.35/50 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταύρωση ανθεκτικότητα.

Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη



