



Προσοχή

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (καπέλο, γάντια και ολόσωμη φόρμα) κατά την εφαρμογή. Φοράτε κατάλληλα γάντια σε περίπτωση εργασιών σε καλλιέργειο όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις ριθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν ασήκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Περιέχει Cyprodinil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από την υποθερμία.

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Χρησιμοποιήστε ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν βρεθεί και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Quality®

300EC

Cyprodinil (Συπροντίνιλ) 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: Cyprodinil 30% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 69,8% β/β

Αρ. Έγκρ.Κυκλ.φ.: 60399/16.01.2014

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προληπτική, και θεραπευτική δράση
για την καταπολέμηση
του φουζικλαδίου στα μηλοειδή &
του βοτρυτή σε αμπέλι**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Παρασκευαστής:

Makhteshim Chemical Works Ltd. - Ισραήλ

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΚΟΥΑΛΥ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου στα μηλοειδή και του βοτρυτή σε αμπέλι (ονοποποίηση και επιτραπέζια σταφύλια). Το cyprodinil παρουσιάζει αποηλαστική κίνηση και διεσπασματική δράση. Παρεμβολίζει τη βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την επιμύκωση του μυκηλίου και την διεσποδή του στη φυλλική επιφάνεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΞΙΟΕΙΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστη δόση: 75 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από την πρόσχη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών. **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Φουζικλάδιο, Καστανή κηλίωση. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστη δόση: 75 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από την πρόσχη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια & Ονοποποίηση σταφύλια):** Βοτρυτής. Δόση: **75-125 κ.εκ./στρέμμα** (75-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το κλείσιμο έως την αλλοίωση του χρώματος των σταφυλίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Μηλιά-Αχλαδιά (75-150), Αμπέλι (50-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Μηλιά-Αχλαδιά (2 εφαρμογές / 7-8 ημέρες), Αμπέλι (2 εφαρμογές / 7-20 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται οι εφαρμογές με **Quality® 300EC** να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιθινουμιμίδες. 2) Οι δόσεις ανά εκατό λίτρα νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. 3) Στα Μηλοειδή, να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνο επαφής. 4) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προεδροποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Τελευταία Επέμβαση πριν τη Συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες.

Αμπέλι (Ονοποποίηση σταφύλια): 21 ημέρες, Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια): 7 ημέρες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το **Quality® 300EC** δεν παρουσιάζει διασυστηματική ανθεκτικότητα με μυκητοκτόνα των ελφ ομάδων: Βενζιμιδαζολικά, καρβαμικά, δικαρβοειδικά, ιμιδαζολικά, τριαζόλης, στρογγυλοφάνες, μορφολίνες και κινολίνες. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζονται μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιθινουμιμίδων πάνω από 4 φορές στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με το μυκητοκτόνο **Merpan® 80WG** και **Bumper® 25EC**.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

01/2014-3