



RAMSIDE 50 WP

Οξυχλωριούχος Χαλκός 50%

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 2092/91, Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (COPPER OXYCHLORIDE) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ψεκασμοί καλύψεως (μέχρις απορροής)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Γκρέϊπ-φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά), **Αμυγδαλιά**, **Καρυδιά**, **Φιστικιά**, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), **ΕΛΙΑ**, **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι), **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)**, **ΠΑΤΑΤΑ**, **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ**, **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✍ Χαμηλής τοξικότητας, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.
- ✍ Ευρύ φάσμα δράσης (χρήση και σε δενδρώδεις και σε εκτατικές καλλιέργειες, βλ. Ετικέτα).
- ✍ Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ✍ 1κιλού
- ✍ 5κιλών
- ✍ 10 κιλών
- ✍ 20 κιλών

****Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.**

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:	21 ημέρες
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ:	28 ημέρες
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:	Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή)
ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια):	21 ημέρες
ΕΛΙΑ:	21 ημέρες
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ+Θ):	7 ημέρες
ΤΟΜΑΤΑ Υπαίθρου:	10 ημέρες
Θερμοκηπίου:	7 ημέρες
ΠΑΤΑΤΑ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:	21 ημέρες

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΡΑΓΚΩΝ 13, 546 26 ΣΟΥΙΤΑ 709-710

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54626

Τηλ. 2310-553354-7, Φαξ. 2310-545235