

REBUT 50WG

Iprodione (Ιπροντιόν) 50 %

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Χn
Υποπτο καρκινογόνος
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εναιωρηματοποίηση Κόκκοι (WG)
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ: 60.352/ 13-3-2013
Εγγ. σύνθεση: Iprodione 50% β/β (500 g/kg)
Βοηθ. ουσίες 48,6 % β/β

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
1 ΚΙΛΟ**

Κάτοχος της Έγκρισης: LANCO S.A.
Ανδρ. Βιζet 6-12, 08191 Rubi (Barcelona) Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ANOPTKAZHM A.E. Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα

Διανομή: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σύνθος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 953 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Όταν χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. - Μην εισπνεύετε τη σκόνη - Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια - Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στη αποχέτευση - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια - Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό

-Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. -

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικινδύνους απόβλητα

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεκτικά δεδομένων ασφαλείας

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αεραστή ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του σε χώρο, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπέλι (ονοποποίηση & επιτραπέζια σταφύλια): για το Βοτρίτι (Botrytis cinerea) με δόση 200-500 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-150 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30 - 50. Μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος: ο 1ος πριν το κλείσιμο των σταφυλιών και ο 2ος από την αλλαγή του χρώματος ως την ωρίμανση των καρπών.

Τομάτα (Θερμοκηπίου): για το Βοτρίτι (Botrytis cinerea) με δόση 125-250 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (150 -200 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 80-120. Μέχρι 2 ψεκασμούς φυλλώματος με μεσοδασίματα 15 ημερών: μετά την άνθηση μέχρι την ωρίμανση

Παρατηρήσεις: Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η υψηλότερη δόση σκευάσματος/ εκατόλιτρο θα πρέπει να συνδυάζεται με τον χαμηλότερο όγκο ψεκαστικού υγρού

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικά και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το καλά με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας: - Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων - Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο - Χρήση του REBUT 50 WG μόνο ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθόγωνα στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαροβιμίδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαινυλοπυρολές - Καθώς στο Βοτρίτι (παθόγωνα υψηλού κινδύνου) η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιείστε νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο ένα μη-δικαροβιμίδιο μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το REBUT αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο Iprodione, διατηρείστε μια καλή περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαροβιμίδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαροβιμιδίων η συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί)

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των φυτών.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι, επιτραπέζια & ονοποποίηση σταφύλια: 14 ημέρες

Τομάτες: 3 ημέρες

Ημ. Παρασκευής (Production Date):

Αρ. Παρτίδας (Lot. No):