

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) • Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληληλα γάντια και μπότες • Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό • Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φορέει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Αποφύγετε την ελευθέρολη του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεητό δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μην χορηγίσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες οι οποίες απέχουν λιγότερο από:

- 15 μέτρα από τα επιφανειακά ύδατα
- 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, όρεορο, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
Η είσοδος των εργατών στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 10 ημέρες για είσοδο ζώων.

Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη
Ημ. λήξης: Βλέπε φιάλη

® Σήμα κατατεθέν της Syngenta

L128234 GREC/2K



Diquat 20% (ντικουάτ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Diquat 20% β/ο (υπό μορφή diquat dibromide 37.4% β/ο), βοηθητικές ουσίες 66.4% β/β.

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 7108/12-2-07

Ημ. λήξης Έγκρ.: 31-12-11

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πηλατύφυλλων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas AEBE**, Α. Ανδρούσης 153 49, Τηλ.: 210 6666612-13, Βίπλεβ Σίνος, Τηλ.: 231 0796940 - 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Ltd**, Αγυθία
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: **Syngenta Chemicals B.V.**, Βέλγιο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas AEBE**, Οινόφυτα, Βιωτιάς

Product names marked © or ™, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 λίτρο €

• Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

• Απαγορεύεται η εφαρμογή του με ψεκασμούς υπέρηκρου όγκου (U.L.V.).

T



ΤΟΞΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πηλατύφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλή σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψήλου όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30 - 50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπκε τύπου σκούπα. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Επεριδεδισθεί: (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γρέιπ φρουτ, Λιμεττιά, Φράπη)
Πυρηνόκαρπα: (Ροδάκινα, Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά) - **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλάδι, Κυδωνιά) - **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φυστικιά, Καστανιά, Καρυδιά) - **Ελιές** (ελαιοποιήσιμες) - **Αμυγνέ:**

Για όλες τις παραπάνω καλλιέργειες σε Πηλατύφυλλα ζιζάνια με 330-500 κ.εκ. σκ./στρ. Διαλύστε 1 λίτ σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρ. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

Τριφύλλι, Μηδική για cuscuta sp με 200-250 κ.εκ. σκ./στρ. Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά τη κοπή.

Πατάτα για αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή με 400 κ.εκ. σκ./στρ. Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής, βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδυλούς είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.

Μηδική για αποροπαγωγή για αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή με 300-350 κ.εκ. σκ./στρ. Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού για όλες τις καλλιέργειες 30-50 λίτ/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 30 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες εκτός πατάτας που είναι 10 ημέρες και Τριφύλλι-Μηδική για τα οποία δεν ορίζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.

2. Η χρήση στις δένδρωδεις καλλιέργειες και στο αμυγνέ πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμυγνέ. 3. Η χρήση για αποξήρανση πριν τη συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για αποροπαγωγή.

Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

