

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• **Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

• **Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

• **Κατάποση:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

• **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμεινεί καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

• **Αναπνοή:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξεπλυνμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμό καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία mandipropamid παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκήθου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

Φάσμα δράσης:

Πατάτα: Για τον Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) 40-60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-80 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μέχρι 6 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες (1). **Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου):** Για τον Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) 60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα (υπαίθρου) και 40-120 λίτρα/στρέμμα (θερμοκηπίου). Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες (2).

Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για τον Περονόσπορο (*Pseudoperonospora cubensis*) 60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα (υπαίθρου) και 40-120 λίτρα/στρέμμα (θερμοκηπίου). Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες (2). **Μαρούλι (υπαίθρου):** Για τον Περονόσπορο (*Bremia lactucae*) 60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-80 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μέχρι 2 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες (2).

Μαρούλι (θερμοκηπίου): Για τον Περονόσπορο (*Bremia lactucae*) 60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μία εφαρμογή. **Αμπέλι:** Για τον Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) 40-60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός καλύψεως όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-12 ημέρες (3).

L161576 GREC/10P



Revus[®]
25 SC

syngenta[®]

Mandipropamid (μαντιπροπαμίντ)
(χημική ομάδα αμιδίων οργανικών οξέων)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Προσώρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 60193/8-7-2008

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Mandipropamid 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 73,06% β/β

**Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση
για την καταπολέμηση του περονόσπορου
στις καλλιέργειες αμπελιού, τομάτας,
πεπονιού, μαρουλιού και πατάτας.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME[®] the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Εφαρμόζετε στις πατάτες την χαμηλότερη δόση όταν η πύση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) κάθε 7 ημέρες και την υψηλότερη όταν η πύση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας) κάθε 10 ημέρες.

(2) Εφαρμόζετε στην τομάτα, στο πεπόνι και στο υπαίθριο μαρούλι όταν η πύση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) κάθε 10 ημέρες και όταν η πύση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας) κάθε 7 ημέρες.

(3) Εφαρμόζετε στο αμπέλι την χαμηλότερη δόση όταν η πύση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) κάθε 10 ημέρες και την υψηλότερη όταν η πύση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας) κάθε 12 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πατάτες, τομάτες, πεπόνι: 3 ημέρες, Μαρούλι: 7 ημέρες, Αμπέλι: 21 ημέρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

• Ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με το REVUS 25 SC, να μην υπερβαίνει το ½ του συνολικού αριθμού ψεκασμών που γίνεται για τους ωοκύκτες.

• Στο αμπέλι συνιστάται να συνδυάζεται με προστατευτικά μυκητοκτόνα. Ο συνολικός αριθμός ψεκασμών να μην ξεπερνάει τους 4.

• Συστή επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση και με το στάδιο της προσβολής.

• Εναλλαγή με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.



Αρ. Παρτίδας:
Η/μ/γία Παραγωγής: