

L142091 GREC/2M



Metalaxyl-M 46,52%, (μεταλαξυλ-Μ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγροτ. Ανάπτ.: 6995/17-5-05

Ημ. Λήξης Έγκρ. Κυκλοφ.: 17-5-2015

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Metalaxyl-M 46,52% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 51,78% β/β

***Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
για τη φυτόφθορα στον καπνό.***

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

***Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.***

Product names marked © or ™, the
SYNGENTA Logo and the CP FRAME
are Trademarks of a Syngenta Group Company

250 ml e

syngenta®

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas AEBE**,
 ΑΘΗΝΑ: Λ. Ανθούσης, 153 49 Ανθούσα, Αττική, Τηλ.: 210 6666612-13,
 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Τηλ. 231 0796940-3
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas AEBE**, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα προστασίας ματιών/προσώπου. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεητό δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβανοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσπαή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

• Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά των ωομυκήτων. Απορροφάται από τις ρίζες και κινείται μέσα στο φυτό με αποτέλεσμα την προστασία των φυτών του καπνού για διάστημα τουλάχιστον 45 ημερών.

Τρόπος εφαρμογής: Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Ridomil Gold 48 SL στο νερό, που προορίζεται για το πότισμα της νέας φυτείας κατά τη μεταφύτευση και ποτίστε.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ποτιστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ποτίζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

Φόσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος & χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστ. υγρού λίτρα/στρ.	
Καπνός	Φυτόφθορα <i>Phytophthora parasitica</i>	100-120	-	-	Με το νερό ποτίσματος κατά τη μεταφύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μία (1).

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά τη μεταφύτευση.

2. Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Εφόσον σε 45 ημέρες από την εφαρμογή του Ridomil Gold 48 SL στο έδαφος απαιτηθεί επέμβαση για την αντιμετώπιση περικοσπόρου στο φύλλωμα, να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν περιέχουν metalaxyl-M ή άλλα μυκητοκτόνα που ανήκουν στην ομάδα φαινυλαμιδίων.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιεργείες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση/καταστροφή του Ridomil Gold 48 SL πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το Ridomil Gold 48 SL παραμένει σταθερό για 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο, υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.



Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη