

RIZOLEX^{50WP}

Tolclofos methyl (τολκκλοφώς-μεθύλ) 50%

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Χημική ομάδα: οργανοφωσφορικό

Εγγυημένη σύνθεση: tolclofos methyl 50% β/β
βοηθ. ουσίες 47,92 % β/β

Αριθμ. Έγκρ. Κυκλοφορίας:
6605/15.03.95

**Οργανοφωσφορικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση
μυκήτων του γένους *Rhizoctonia*. Χρησιμοποιείται
για επένδυση σπόρων σποράς βάμβακος**

Περιέχει tolclofos methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά
και ζωοτροφές. - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην
πίνετε, μην καπνίζετε. - Μην αναπνέετε τη σκόνη.
" Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση αδιαθεσίας
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη
συσκευασία ή ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης**
ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό σε
άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. **Σε περίπτωση**
επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και
σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλυθείτε
αμέσως με άφθονο νερό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων
ασφάλειας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα
κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) μαζί με τα κουτιά, που θα
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας..

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή
συσκευασία μακριά από υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής - Ημ.Λήξης: βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση-Παρασκευαστής:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, 2 rue Claude
Chappe 69370 St-Didier-au-mont-d' Or, Γαλλία
Εργοστάσιο παρασκευής: SBM Formulations, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Εργοστάσιο συσκευασίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΔΟΣΕΙΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σπόρος βαμβακιού: Τήξεις φυταρίων από
Rhizoctonia solani. Δόση εφαρμογής 300γραμ / 100 κιλά σπόρου. Επένδυση σπόρων με τη μέθοδο slurry
με 1 λίτρο νερό ανά 100 κιλά σπόρου.

Παρατηρήσεις: Για ταυτόχρονη καταπολέμηση και άλλων μυκήτων εδάφους πρέπει να χρησιμοποιείται σε
μίγμα με άλλα μυκητοκτόνα κατάλληλα για επένδυση σπόρων στην προτεινόμενη εγκεκριμένη χρήση τους
και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι συνδυάζονται μεταξύ τους.

Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry. **A.** Η επένδυση γίνεται μέσα σε
μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση ενός πυκνού
πολτού(slurry) στην εγκεκριμένη αναλογία και με την εξής διαδικασία:

Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται προσθέτουμε τη δόση του RIZOLEX 50WP μέσα στο δοχείο της
μηχανής. Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε
λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.**B.** Με τη χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ.
μιας μπετονιέρας βαρελιού ή και πλαστικών σάκκων) όπου πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο
νερό (1 λίτρο για 100κιλά σπόρου) με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της ανάλογης
ποσότητας RIZOLEX 50WP και ανάμιξη επί 3-5 λεπτά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι
σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων καθώς και για παραγωγή βαμβακέλαιου ή βαμβακοπλακούντα
(βαμβακόπιτα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους σάκους που συσκευάζονται σπόροι επενδεδυμένοι να αναγράφεται η φράση "Οι σπόροι
αυτοί είναι επενδεδυμένοι με tolclofos methyl. Να μη χρησιμοποιούνται για τροφή ανθρώπων ή ζωοτροφή ή
για παραγωγή βαμβακέλαιου ή βαμβακοπλακούντα."

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα: Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα εγκεκριμένα για επένδυση
σπόρων με τη μέθοδο slurry.