

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ●Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε ●Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.●Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου. ●Φοράτε κατάλληλες μπότες ● Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

"Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. Αντίδοτο : Δεν έχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατρωπίνης και οξείμης δεν ενδείκνυται. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.77.93.777**

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μεθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία glyphosate. Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρηνά και με τρόπο ώστε τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας και της πρόσβασης των ζώων στην ψεκασμένη περιοχή: Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δέκα τεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. Δεν επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΘΗΚΗΣΥΝΕΣ: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική στραγγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

RODEO® 36SL

GLYPHOSATE (ΓΚΛΥΦΟΖΕΙΤ) 36%

Εγγυημένη σύνθεση:

Glyphosate οξύ 36% β/ο

[σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6%β/ο]

Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

Αρ. Εγκρ. Υπ. Γεωργίας:
7442 / 9.6.93

**Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
Καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και
πλατύφυλλα ζιζάνια, καθώς και ξυλώδεις θάμνους,
υδροχαρή ζιζάνια και την οροβάγχη του καπνού.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**Κίνδυνος σοβαρών
οφθαλμικών βλαβών**

**Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς. Μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον.**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 ΛΙΤΡΟ**



© Reg. Trademark used under licence

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής:
MONSANTO EUROPE S.A., Βέλγιο

Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ΦΙΛΟΚΡΟΠ Α.Ε. Φλέμινγκ 15, Μαρούσι, Αθήνα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



xeλλαφορμ.Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.90-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 230.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ- φρουτ, Κιτριά), **Ακρόδρυα** (Αμυγδαλιά), **Μηλοειδή** (Μήλια, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα** (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινια, Κερσάδα), **Αμύγδα** (Επιτραπέζια & Οινολογισίμα), **Ελιές**.

α) Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη, πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ./στρ. Ειδικά για τα ετήσια μολόχα (*Malva spp*), Τσουκνίδα (*Urtica spp*), Πολύγωνο (*Polygonum spp*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) χρήση 400-600κ.εκ./στρ.Δύο (2) το πολύ εφαρμογές στο στάδιο της ζωής ανάπτυξης των ζιζανίων.

β)Πολυετή ζιζάνια (**) (αγρωστώδη, πλατύφυλλα) :500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του ζιζανίου). Μία(1) εφαρμογή κοντά, κατά ή λίγο μετά την άνθηση των ζιζανίων. Αγριάδα (*Cynodon dactylon*):750-1000 κ.εκ./στρ., Βελιούρας(*Sorghum halepense*):500 κ.εκ./στρ., Φτέρη(*Pteridium aquilinum*) 500 κ.εκ./στρ., Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*): 1000 κ.εκ./στρ., Κίρσιο (*Cirsium arvense*): 1000 κ.εκ./στρ., Κύπερη(*Cyperus sp*): Δύο(2) εφαρμογές: α) 600κ.εκ./στρ.κατά την άνθηση και β)500 κ.εκ./στρ., σε περίπτωση αναβλάστησης.

Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά: α)Ετήσια (*) και β)Πολυετή ζιζάνια(): Με τις α.α. οδηγίες. Μία εφαρμογή (1) για κάθε ομάδα ζιζανίων.**

Βομβάκι():**Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας με 150-200κ.εκ./στρ, για τα ετήσια ζιζάνια (1 εφαρμογή) και με 500κ.εκ./στρ, για τα πολυετή ζιζάνια (βελιούρα)(1 εφαρμογή).

Καπνός: Για την καταπολέμηση της οροβάγχης εφαρμόζεται με δύο(2) ψεκασμούς καλύψεως: α)με 40κ.εκ./στρ 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και β)με 60 κ.εκ./στρ 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: α)Ετήσια ζιζάνια (*) : Δύο (2)το πολύ εφαρμογές, β)Πολυετή ζιζάνια(**):Με τις α.α. οδηγίες. Μία (1) εφαρμογή, γ)Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα (*Rubus*) κ.λπ: 500-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή στην πλήρη ανάπτυξη.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Υδροχαρή ζιζάνια: 800-1000 κ.εκ. Μία (1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Σε όλες τις χρήσεις (πλην καπνού) εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα/στρ. Μόνο στον καπνό, για την καταπολέμηση της οροβάγχης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό/στρ.

(*)Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή και καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά ή λίγο μετά από αυτή.

(***)Στο βομβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτήρων) γύρω από τα μπεκ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπελία ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφάδες και μη επωλυμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο)έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια: *Malva spp* (μολόχες), *Urtica spp* (τσουκνίδες), *Polygonum spp* (πολυκόμπι, λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600κ.εκ/στρ, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγριάδα η εφαρμογή του να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30κ.εκ. 4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλώμα της κορυφής. 5. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστώνων, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλώδων φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φτείας. Χρησιμοποιείται μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Εμεικνουμε τελείως το ψεκαστικό Butio. Ξεπλύνετε το Butio και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις(3) φορές με καθαρό νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό Butio. Ξεπλύνετε το Butio και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις(3) φορές με καθαρό νερό.

Τελειότητα επέμβαση πριν από τη συγκομιδή: 7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Αρ. Παρίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ηρ. Λήξης: Βλέπε ένα μέρος φιάλης