

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιεχόμενός του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε την ελεύθερωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεληίο δεδομένων ασφαλείας. • Οι ερπυστές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εκτεθούν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Για να αποφευχθεί κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση εστιασής: Αν εμφανιστούν αναπνευστικές ή άλλες δυσκολίες κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλέτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει απαστοχίες.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7737777

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτί μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαστικό βυτίο αναδύοντάς το. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ροδακινία, Νεκταρινία, Βερικοκό, Φρούλα, Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Αγγούρι, Αγγουράκι τουρού, Κολοκύνθ (υπαίθριου), Μελπονή (θερμοκηπίου), • Φασόλι, Αρακάς (υπαίθριου), 3 ημέρες, Δαμασκηνιά - Φασόλι, Αρακάς (θερμοκηπίου), • Ιμαρούλι υπαίθριου: 14 ημέρες, Αμπέλι (επιτραπέζια, ονοπαοποίηση), Κρεμμύδι (ξηρός βολβός), Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μελιτζάνα θερμοκηπίου: 21 ημέρες, Ακτινίδα: 15 ημέρες, Κρότος: 27 ημέρες, Πεπόνι (υπαίθριου), Βερκοκίτι (υπαίθριου), 7 ημέρες, Αμυγδαλιά, Σπαράγγι — **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: —

ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ — ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, θροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΗΣΤΕΡΙΑ: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίησετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυνμα (τα νερά του ξεπλυνμάτος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενταπιόνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Απογορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων για τις δεινδρώδεις καλλιέργειες** και **5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες** από τα επιφανειακά ύδατα.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Rovral® Aquaflo 50 SC

BASF
The Chemical Company

Iprodione (Ιπροντιόν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Iprodione 50% β/ο (ομάδα δικαρβοξυμιδίων)

Βοηθητικές ουσίες 55.03% β/β



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ύποπτο καρκινογόνωσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6664/2-6-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

©Σήμα κατατεθέν BASF.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ — ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ — ΔΟΣΕΙΣ — ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Εναντίον της **Μονιλιάς ανθέων (Monilia laxa)**, με δόση 150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην άνθηση. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Εναντίον της **Μονιλιάς ανθέων (Monilia laxa)** και **κρυπίας (Monilia fructuosa)**, με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Για την Μονιλία και ανθέων κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην άνθηση. Για την Μονιλία των καρπών κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην ωρίμανση των καρπών. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **ΑΜΠΕΛΙ:** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με δόση 150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες από την πλήρη άνθηση ως την ωρίμανση των καρπών. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με δόση 150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες ξεκινώντας από την έναρξη της άνθησης. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **ΑΚΤΙΝΙΔΑ:** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 1 ψεκασμό φυλλώματος από το στάδιο της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **ΚΑΡΟΤΟ:** Εναντίον της **Αλτερνάριας (Alternaria spp.)**, με δόση 150 κ.εκ./στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρός βολβός):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia sclerotiorum)**, με δόση 150 κ.εκ./στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Αλτερνάριας (Alternaria solani)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)**, με δόση 100-440 κ.εκ./εκατόλιτρο (τομάτα), 150-440 κ.εκ./εκατόλιτρο (πιπεριά, μελιτζάνα). Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 7-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρ. (τομάτα), 50-100 λίτρα/στρ. (πιπεριά, μελιτζάνα). **ΑΓΓΟΥΡΙΑ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΟΥ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)**, με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. (υπαίθριου), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΠΕΠΟΝΙ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθριου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)**, με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. (υπαίθριου), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)**, με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. (υπαίθριου), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΚΟΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ:** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Αλτερνάριας (Alternaria solani)**, της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)** και της **Ριζοκτονίας (Rhizoctonia solani)**, με δόση 150 κ.εκ./στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia spp.)** και της **Ριζοκτονίας (Rhizoctonia solani)**, με δόση 150 κ.εκ./στρ. (υπαίθριου) και 120 κ.εκ./στρ. (θερμοκήπιο). Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με το στάδιο με 2-3 φύλλα μέχρι το κλείσιμο των νηριών. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρ. **ΦΑΣΟΛΙ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου)-ΑΡΑΚΑΣ (Υπαίθριου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληροτίνιας (Sclerotinia sclerotiorum)** με δόση 100-150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες κατά την άνθηση. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρ. (υπαίθριου), 100-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Σκωρίωσης (Puccinia asparagi)** και του **Στεμφυλίου (Stemphylium sp.)** (μέτρια δόση), με δόση 150 κ.εκ./στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΣΚΥΛΛΟΚΟΚΚΙ (Υπαίθριου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με δόση 150 κ.εκ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Ψυκας ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** Ακτινίδα: 1 - Λοιπές καλλιέργειες: 2. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού. β) Στην Ελλάδα η πολυχρόνια εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος έχει δείξει άριστη αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δόση στην τρύπα. **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** • Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων. • Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. • Χρήση του ROVRAL Aquaflo 50 SC μόνο ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα-στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαρβοξυμικά, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαυλοτυπρόλες. • Ειδικά για το Βοτρυτί (παθόγονο υψηλού κινδύνου) όπου η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιήστε νωρίς ένα από τα καλλιεργητικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο δικατοχό και εφαρμόστε το ROVRAL Aquaflo 50 SC αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανατρώς). Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2 για όλες τις καλλιέργειες. Ειδικά για την καλλιέργεια της ακτινίδας, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο iprodione, διατηρήστε μια καλλιεργητική περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξυμικά και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξυμικών ή συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί). **-Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με pH < 6 καθώς υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης.**