

Rovral® 75 WG

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σκευάσματος) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΑΜΠΕΛΙ: Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), με δόση 100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες από την πλήρη άνθηση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), με δόση 100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. **ΚΑΡΟΤΟ:** Εναντίον της **Αλτερνάριας** (*Alternaria* spp.), με δόση 100 γρ./στρέμμα. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρ. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρός βολβός):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia sclerotiorum*), με δόση 100 γρ./στρέμμα. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρ. **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), της **Αλτερνάριας** (*Alternaria solani*) και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.), με δόση 70-290 γρ./εκατόλιτρο (τομάτα), 100-290 γρ./εκατόλιτρο (πιπεριά, μελιτζάνα). Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 7-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. (τομάτα), 50-100 λίτρα/στρ. (πιπεριά-μελιτζάνα). **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.), με δόση 70-100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. (ύπαιθρος), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.), με δόση 70-100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. (ύπαιθρος), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΠΕΠΟΝΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθρου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.), με δόση 70-100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ:** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), της **Αλτερνάριας** (*Alternaria solani*), της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.) και της **Ριζοκτόνιας** (*Rhizoctonia solani*), με δόση 100 γρ./στρέμμα. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia* spp.) και της **Ριζοκτόνιας** (*Rhizoctonia solani*), με δόση 100 γρ./στρέμμα (ύπαιθρος), 80 γρ./στρέμμα (θερμοκήπιο). Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες μετά το στάδιο των 2-3 φύλλων, μέχρι το κλείσιμο των γραμμών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. **ΦΑΣΟΛΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)-ΑΡΑΚΑΣ (Υπαίθρου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), και της **Σκληρωτίνιας** (*Sclerotinia sclerotiorum*) με δόση 70-100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες κατά την άνθηση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. (ύπαιθρος), 100-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), της **Σκωρίωσης** (*Puccinia asparagi*) και του **Στεμφυλίου** (*Stemphyllium* spp.) (μέτρια δράση), με δόση 100 γρ./στρέμμα. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Εναντίον του **Βοτρύτη** (*Botrytis cinerea*), με δόση 70-100 γρ./εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού. β) Στην Ελλάδα η πολυχρόνη εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος έχει δείξει άριστη αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δόση στην τομάτα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων. • Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. • Χρήση του ROVRAL 75 WG μόνο ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα - στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαρβοξυμίδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαινολοπυρρόλες • Ειδικά για το Βοτρύτη (παθογόνο υψηλού κινδύνου) όπου η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιήστε νωρίς κατά την καλλιεργητική περίοδο ένα μη-δικαρβοξυμίδιο μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το ROVRAL 75 WG αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2 για όλες τις καλλιέργειες. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο iprodione, διατηρήστε μια καλλιεργητική περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξυμίδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξυμιδίων ή συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί). • **Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με pH < 6 καθώς υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανιστούν αναπνευστικές ή άλλες δυσχέρειες κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **Γιατροί:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.



Rovral® 75 WG

Iprodione (Ιπροντιόν)

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Iprodione 75% β/β (ομάδα δικαρβοξυμιδίων)
Βοηθητικές ουσίες 21,87% β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Ερεθίζει τα μάτια.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60182/2-6-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 650 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

® Σήμα κατατεθέν BASF.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαστικό βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (επιτραπέζια-οινοποιήσιμα) - Κρεμμύδι (ξηρός βολβός) - Μπρόκολο - Κουνουπίδι - Μαρούλι (θερμοκηπίου): **21** ημέρες. Φράουλα - Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (θερμοκηπίου) - Αγγούρι, Αγγουράκι τουρσί - Αρακάς (υπαίθρου) - Κολοκύθι (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Φασόλι (υπαίθρου): **3** ημέρες. Καρότο: **27** ημέρες. Πεπόνι (υπαίθρου-θερμοκηπίου) - Καρπούζι (υπαίθρου): **7** ημέρες. Μαρούλι (υπαίθρου) - Φασόλι (θερμοκηπίου): **14** ημέρες. Σπαράγγι: Δεν ορίζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Αρ. παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας