

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. Μην τρωτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση απύχνηματος ή να αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: τοποθετείτε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προσπαείτε τον από υποθερμία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση/ καταστροφή του Samson, πρέπει να γίνεται σε υψικάμινου που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

0114

SAMSON EXTRA 6 OD

Nicosulfuron
(ομάδα πυριμιδινυλσουλφονουρία)

Εγγυημένη σύνθεση:
nicosulfuron 6% β/ο
βοηθητικές ουσίες 93,4% β/β

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του Καλαμποκιού Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθιστικό στα μάτια.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70012/ 21-1-2013

Περιεχόμενο 750 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης:



ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B, Bus 9, Diegem B-1831, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

Κ.Θ. Ευθυμιάδης οβ.ε.ε

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεγαλακτικού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αραβοσίτος

ΣΤΟΧΟΣ:

Αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίστα (*Echinochloa crus-galli*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*).

Πλάτυφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus* spp.), Τάτουλα (*Datura stramonium*)

ΔΟΣΗ: 75 κ.εκ./στρέμμα.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Για μουχρίστα και σετάριες από τα 2 φύλλα έως το αδέλφωμα.

- Για βέλιουρα από τα 2-6 φύλλα έως το αδέλφωμα.

- Για πλατύφυλλα ζιζάνια στα 2-6 φύλλα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου.

2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 25 κ.εκ./στρέμμα.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος, με πίεση μικρότερη από 2,5Atm (40psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά.

- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία.
- Χρησιμοποιείτε το ίδιο διάλυμα για το ξεπλύμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Να αποφευχθεί η χρήση ολακλήρου του φυτού του αραβοσίτου ως ζωοτροφή, πριν την ωρίμανσή του. -Να μην πραγματοποιείτε ψεκασμό εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες. - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με την φορά του ανέμου. - Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το SAMSON EXTRA 6 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος.

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του SAMSON EXTRA 6 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Είσοδος του εργάτη στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C. Κατά την 1^η - 2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -