

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την εξευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελητίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό και χορηγήστε ζωικό άνθρακα με την προϋπόθεση ο ασθενής να έχει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στις συνιστώμενες καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία από -5°C έως 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά: 35 ημέρες

Σπαράγγι: -----

Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας, οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DIM's.

L156867 GREC/3P



syngenta.

Difenoconazole (ντιφenoκοναζόλ)

(Χημική ομάδα τριαζόλης)

Γαλιτωματοποίηση υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγροτ. Ανάπτ.: 6515/20-9-1990

Ημ. λήξης Έγκρ. Κυκλ.: 31-12-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Difenoconazole 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 74,92% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection AG
Basel, Switzerland

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

www.syngenta.gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.


Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product name marked R or TM, the ALLIANCE FRAMING

the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are

are Trademarks of all Syngenta Group Companies

1 lt e



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φάσμα δράσης:

Μηλιά: Για το Φουζικιάδιο (*Venturia inaequalis*) 10-15 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-37,5 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο της ρόδινης κορυφής (συνήθως το μήνα Μάρτιο) και συνεχίζονται ανά 10-14 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (φυσικό αραίωμα) (συνήθως τέλος Μαΐου) και σύμφωνα με τις αγροτικές προειδοποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερπητική περίοδο: 4. **Σπαράγγι:** Για τη Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*) 30-40 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα.

Τρεις (3) επεμβάσεις στο υπέργειο μέρος της καλλιέργειας μετά τη συγκομιδή των βλαστών από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, με μεσοδιάστημα 15 ημέρες και κατά προτίμηση σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης, που δεν ανήκουν στην ομάδα των DIM's για καλύτερη διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερπητική περίοδο: 3.

Ζαχαρότευτλα: Για την Κερκοσπορίαση (*Cercospora beticola*) 62-125 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Οι εφαρμογές ξεκινούν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (Μαίο - Ιούνιο) και επαναλαμβάνονται κάθε 15-20 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερπητική περίοδο: 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

2. Στην περίπτωση του πράσινου σπαργαγιού γίνεται πρώτα η συγκομιδή των πράσινων βλαστών και μετά αρχίζουν οι εφαρμογές στο υπέργειο μέρος. Όσοι πράσινοι βλαστοί παραμένουν μαζί με το φυλλώδες υπέργειο μέρος κατά την περίοδο των ψεκασμών δεν συγκομίζονται αλλά απομακρύνονται μαζί με ολόκληρο το υπέργειο μέρος του φυτού μετά το τέλος του φθινοπώρου, όπως γίνεται και στην καλλιέργεια του άσπρου σπαργαγιού.

Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη

