

# SELIBATE EXTRA PBW

## Gossyplure (Γκοσυπλούρ) 8%

VP (Προϊόν έκλισης ατμών)

Εγγ. σύνθεση: Gossyplure (mixture of Z,Z/E-7 hexadecadien-1-yl acetate+Z,E-7,11-hexadecadien-1-yl acetate)) 8% β/β, Βοηθητικές ουσίες 91.1% β/β

Φερομόνη φύλου του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*)  
που δρα με την παρεμπόδιση σύζευξης

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

### ΠΕΔΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**BAMBAKI:** για Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*). Με την εμφάνιση των πρώτων ακμάων και πριν αρχίσει η προσβολή, αφότου τα νεαρά φυτά εμφανίσουν το πρώτο ζευγάρι πραγματικών φύλων τοποθέτηση 30-35 δακτυλίων / στρέμμα

**Παρατηρήσεις:** 1. Διάρκεια δράσης: 75-100 ημέρες από την ανάρτηση των δακτυλίων. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως από τη θερμοκρασία και την ένταση του πνέοντος ανέμου. 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού (monitoring), η τοποθέτηση των δακτυλίων πρέπει να γίνεται εφόσον σε δύο συνεχείς νύχτες συλληφθούν τουλάχιστον δύο ακμαία του ρόδινου ανά νύχτα. Καθυστερημένη εφαρμογή μειώνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. 3. Τα χωράφια πρέπει να είναι επίπεδα, μακριά από εθνικούς δρόμους, ηλεκτρικό φωτισμό και οπωδόποτε όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές. 4. Συνήθως μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο. Πάντως συνιστάται η παρακολούθηση του ρόδινου σκουληκιού με φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πληθυσμού και σε τυχόν περίπτωση μεγάλης αύξησης του, συνιστάται συμπληρωματικά, ψεκασμός με εντομοκτόνο. 5. Συνιστάται στελεχοκοπή και παράχωμα των υπολειμμάτων του βαμβακιού μετά τη συγκομιδή, με σκοπό τον περιορισμό του αρχικού πληθυσμού του ρόδινου σκουληκιού. 6. Στην περίπτωση που η έκταση εφαρμογής γειτνιάζει με βαμβακοφυτείες στις οποίες δεν εφαρμόζεται καταπολέμηση του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται να γίνονται παρατηρήσεις στα σύνορα του κτήματος για τον εντοπισμό πιθανών προσβολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο στα σύνορα του κτήματος. 7. Για να αποδώσει ικανοποιητικά η μέθοδος, η έκταση όπου οι εφαρμόζεται πρέπει να υπερβαίνει τα 50 στρέμματα. 8. Η καλλιέργεια βαμβακιού θα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από άλλες ευαίσθητες στο ρόδινο σκουλήκι καλλιέργειες. 9. Η χρήση της φερομόνης προσδιάζει σε προγράμματα εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων εχθρών του βαμβακιού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα έντομα και μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

**Τρόπος εφαρμογής:** Τοποθέτηση των δακτυλίων στους βλαστούς που βρίσκονται κοντά στην κορυφή των βαμβακοφύτων σε κανονικές αποστάσεις ώστε να ξεσαφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή τους στη φυτεία.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Δεν έχει εφαρμογή.

**Φυτοτοξικότητα:** Ο τρόπος χρήσης του αποκλείει την πιθανότητα φυτοτοξικότητας (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα φυτά).

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Η μορφή και ο τρόπος εφαρμογής του αποκλείουν την ανάμειξη του SELIBATE EXTRA PBW με άλλες ουσίες.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με τα ξεπλύματα.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Βαμβάκι: Μη εφαρμόσιμο.

**Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μέχρι 30 °C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται για ένα χρόνο. Να μην τοποθετείται στην κατάψυξη.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ:  
9036/25-05-1998

Κάτοχος της έγκρισης -  
AgriSense-BCS Ltd.,  
Road Treforest Ind. Estate  
Pontypridd-South Wales, CF37 5SU  
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος επικοινωνίας,  
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σινόδος, τηλ. 2310.797.907  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Συντίθεται Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380. 22.008-9

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:**  
**250 τεμάχια**

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια - Μη μολύνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοηθείες Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τ η λ έ φ ω ν ο Κ έ ν τ ρ ου Δηλητηριάσων:** 210 77 93 777

05/13

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Ημ. παρασκευής, Ημερ. Λήξης, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας