



Προσοχή

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση στο σκεύασμα.

Να μη χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών.



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ηρωμένα ρούχα και πλυθείτε με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας τα βλεφάρια ανοικτά και συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν δεν αναπνέει σωστά, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΣΠ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το 1/3 του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, προσθέστε την κατάλληλη δόση ή τον υδατοδιαλυτό σάκκο στο νερό, ανακατέψτε καλά και γεμίστε το ψεκαστικό με νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Φουζυκλάδιο. Δόση: 10-15 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προετοιμασιών, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Φαία σήψη. Δόση: 10-15 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές στην έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθηση.

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο. Δόση: 10-15 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές: α) όταν οι βλαστοί αποκτάσουν 3-4 φύλλα, β) άνθηση, γ) λίγο μετά το δέσιμο των ραγών.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Σκωρίαση. Δόση: 20-30 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 15 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Αμπέλι (50-150), Σπαράγγι (100), Μηλιά (100-200), Ροδακινιά (150-250).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδος: Μηλιά-Αμπέλι (4), Ροδακινιά (3), Σπαράγγι (6).

Ship®

10WG

Cyproconazole (Συπροκοναζόλη) 10% Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Cyproconazole** 10% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 89,7% β/β
Α.Α.Δ.Α.: 60231/23.12.2008

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Europe b.v.b.a.

Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Sharda Balkan ΜΕΠΕ

Παύλου Μελά 1, 15233 Χαλάνδρι

Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αναστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/οικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Μέλος του



Παρατηρήσεις:

Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή. • Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας. • Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά-Σπαράγγι: 90 ημέρες.

Αμπέλι: 28 ημέρες.

Ροδακινιά: 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες δόσεις.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

01/2014-3



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 150 γρ.