

Μυκητοκτόνο
80WG
Bρέξιμοι κόκκοι (WG)
SILVANUS
Σουλφούρι



Σιλβάνους
SILVANUS 80WG
Μυκητοκτόνο

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρμ./100 λίτρα ψεκ υγρό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα/ στρ.	ΔΟΣΕΙΣ (γρμ./στρ.)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά	ΐδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	400	100 - 200	400 - 800	4	Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής.
		200-300		200 - 600		Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	500	100 - 200	500 – 1000		Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Ροδακινιά Βερικοκιά	ΐδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	300- 400	150 - 250	450 - 1000	4	Στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κόλακα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Αμπέλι	ΐδιο (<i>Uncinula necator</i>)	200- 400	50 - 150	100 - 600	4	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ.
		100- 200		50 - 300		Κατά την άνοδο μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του γυαλισματος » των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.
	Ερίνωση (<i>E. Taphyes vitis</i>)	1000	50 - 150	500 - 1500		Έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών.
Τρούτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	ΐδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	200-300	50 - 100	100 - 300	4 / 10-15	Με την εμφάνιση των πρώτων οsymτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, κολοκυθί, πεπόνι, καρπούζι)	ΐδιο (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca Fulliginea</i>)	200-300	50 - 80	100 - 240	4 / 10-15	Με την εμφάνιση των πρώτων οsymτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Τριανταφυλλιά	ΐδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	200-300	50	100 - 150	4	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Παρατηρήσεις: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιεργειες Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.

Σιλβάνους
SILVANUS 80WG
Μυκητοκτόνο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

«Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: πιείτε δύο ποτήρια νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (Σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο(2) χρόνια.



Σιλβάνους
SILVANUS 80WG
Μυκητοκτόνο

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Sulfur (Σουλφούρ) 80 %

Εγγυημένη Σύνθεση: Sulphur 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 19,19% β/β

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: **6906/10.06.2003**

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
SELECTIS Productos Para Agricultura S.A.,
Herdade das Praias, Apartado 120 – E.C. Bonfim 2901-877 Setubal Πορτογαλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.: 542 49
Τηλ.: 2310 334377 Fax: .: 2310 334378
E-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com

Καθαρό βάρος: 1 κιλό



Σιλβάνους
SILVANUS 80WG
Μυκητοκτόνο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα να χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παρασκευή του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 °C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Για όλες τις καλλιέργειες: 7 ημέρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

