

Καθαρό βάρος:
2,5 kg e



Sirocco® M 4/40 WP

cymoxanil (συμοξανίλ) 40 g/kg
mancozeb (μανκοζέμπ) 400 g/kg

Μυκητοκτόνο

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση :	cymoxanil	4 %	β/β
	mancozeb	40 %	β/β
	Βοηθητικές ουσίες	45,88%	β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.



The miracles of science™

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ
ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡ.
ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
60.217/30-10-2008

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη. • Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό.). • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. • Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε τον να ηρεμήσει. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα.

Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τε χυτή αναπνοή.

Καλέστε γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα από το φάρμακο ρούχα και συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.

Να μη χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το
σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Sirocco M 4/40 WP είναι ένα μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb), με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμπέλι: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*), συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί, στη δόση 250-300 γραμ./100 λίτρα νερό/στρέμμα, στα παρακάτω στάδια. α) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. β) στο στάδιο του μούρου γ) στην άνθηση δ) λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων : 7-14 ημέρες

Τομάτα, Πατάτα: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί στη δόση 250-300 γραμ./100 λίτρα νερό/στρέμμα όταν αρχίζουν τα φυτά να έχουν ύψος 15-20 εκ. κι επαναλαμβάνονται ανά 7-14 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4 (Αμπέλι, Τομάτα, Πατάτα).

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το εύρος της δόσης και του μεσοδιαστήματος επεμβάσεων είναι ανάλογο της έντασης προσβολής από το παθογόνο.

- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

- Το Sirocco M 4/40 WP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περισσείας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνεται τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ■ Αμπέλι: 28 ημέρες ■ Τομάτα υπαίθρου: 21 ημέρες, Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες ■ Πατάτα: 21 μέρες

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τη χρήση και τις δόσεις που συνιστάται στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Παρασκευαστής:

DuPont International Operations Sarl,
Ελβετία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα - Τηλ: 210 688 9777 - 9778

Τυποποιητής και συσκευαστής:

STI Solfotecnica Italia Spa.
Via Evangelista Torricelli 2 I-48010 Cotignola,
Ιταλία

® Σήμα κατατεθέν της
Du Pont de Nemours (France) S.A.S.



3 576960 054829

K-31932/31308 - GREECE

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: