

Starane™ Gold

SE

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Fluroxypyr (ομάδα πυριδινών)
Florasulam (ομάδα τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδινών)

Εγγυημένη σύνθεση: Fluroxypyr 10% β/ο
(υπό μορφή fluroxypyr meptyl 14,4 β/ο)
Florasulam 0,1% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 83,65% β/β

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

Εκλεκτικό Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά και στο καλαμπόκι

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Παρασκευαστής σκευάσματος - Κάτοχος της έγκρισης:
Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση -
Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:



ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr
*TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας:
7965/ 28-12-2011

Περιεχόμενο:
1,5 λίτρο

105X120

Starane™ Gold

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απεκατοητή ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες/μπιετόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπονημένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε κανονικές θερμοκρασίες.
Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε φιάλη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



0113

60X120

Dow AgroSciences

Starane™ Gold

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το STARANE GOLD είναι μίγμα των δραστικών ουσιών fluroxypyr και florasulam για μεταφυτρωτική εφαρμογή για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά και στο καλαμπόκι.
Το fluroxypyr απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης των ζιζανίων.
Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδινών. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεκογολακτική συνθεάση (acetolactate synthase - ALS).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για πλατύφυλλα ζιζάνια στη δόση **120 κ.εκ/στρέμμα** με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά στο στάδιο 3-6 φύλλων (BBCH13- BBCH16).

Σιτάρι (μαλακό-σκληρό), Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριπτάλε για πλατύφυλλα ζιζάνια στη δόση **180 κ.εκ/στρέμμα** με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά στο στάδιο: Α. στα χειμερινά σιτηρά BBCH13-BBCH45 (3 φύλλα έως την πλήρη διόγκωση του φύλλου «σημαίας»), Β. σε ανοιχτά σιτηρά BBCH13-BBCH32 (3 φύλλα έως το 2^ο γόνατο).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Καταπολεπούμενα ζιζάνια

στο σιτάρι: *Galium aparine* (Κολητοίδα), *Stellaria media* (Στελλάρια), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), *Matricaria chamomilla* (Χαμομήλι), *Papaver sp* (Παπαρούνα), *Capsella bursa-pastoris* (Καψέλλα), *Sinapis arvensis* (Σινάπι), *Fumaria officinalis* (Καπνόχορτο), *Polygonum aviculare* (Πολυκόμυ), *Sonchus oleracea* (Ζωχός), *Veronica spp* (Βερβόνια), *Raphanus raphanistrum* (Ραπάνιδα), *Fallopia convolvulus* (Αναρχώμενο πολύγονο), *Rapistrum rugosum* (Ράπιστρο), *Diploisis eucoides*, *Myagrum perfoliatum*.

στο καλαμπόκι: *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβάκι), *Amaranthus spp* (Βλήτα), *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Xanthium strumarium* (Αγριοελιτζάνα), *Solanum nigrum* (Αγριοτομάτα), *Galium aparine* (Κολητοίδα), *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά), *Bidens tripartita*.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός μεταφυτρωτικά με 20-40 λίτρα νερό / στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αναδεύετε συνεχώς. Ξεπλύνετε το δοχείο συσκευασίας με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποβλήματα στο ψεκαστικό διάλυμα.

Καθαρσιμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό πριν τον ψεκασμό. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπέκ και τα φίλτρα. Το ψεκαστικό να μη στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε εδάφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να αποκλειστεί: Το προϊόν μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στην ετικέτα. Ειδικότερα, το προϊόν μπορεί να βλάψει ευπαθείς καλλιέργειες όπως η άμυλας, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά κλπ. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφύγετε το προϊόν να έλθει σε επαφή με τέτοιες καλλιέργειες, ακόμη και υπό τη μορφή ατμών που μεταφέρονται από τον άνεμο.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στο καλαμπόκι, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα των προϊόντων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και

- σποράς της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση ανάγκης επανασποράς της καλλιέργειας λόγω καταστροφής στα πρώτα στάδια ανάπτυξης επιτρέπεται η σπορά σιτηρών χωρίς να περιμένετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σπορά με άλλη καλλιέργεια επιτρέπεται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

- της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Απαγορεύεται η είσοδος των εργατών για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται

105X120